















## Épocas de Tratamento em Videira (uva de mesa)

	Fases da Vinha															
Problemas		Reposou vegetativo	Ponta verde	Saída das folhas	Folhas soltas	Cachos visíveis	Cachos separados	Botões florais separados	Floração	Alimpa	Bago de chumbo	Bago de ervilha	Fecho dos cachos	Pintor	Maturação Colheita	
Infestantes	Gramíneas	Targa® Gold <sup>(1)</sup> (1-3 L/ha)														
	>4 anos	Roundup® UltraMax (1,5-10 L/ha)														
Escoriose			Rhodax® Flash (0,9 kg/ha)													
Míldio				Profiler® (1,3-2,5 kg/ha) <sup>(2)</sup>						Melody® Cobre <sup>(3)</sup> (1,5 kg/ha)						
Oídio			Prosper® (0,6 L/ha) ou Horizon® (0,4 L/ha) <sup>(4)</sup>		Flint® (0,15 kg/ha) ou Flint® Max (0,16 kg/ha) <sup>(5)</sup>			Luna® Privilege (60-200 ml/ha) <sup>(6)</sup>		Flint® (0,15 kg/ha) ou Flint® Max (0,16 kg/ha) <sup>(5)</sup>		Prosper® (0,6 L/ha) ou Horizon® (0,4 L/ha) <sup>(4)</sup>				
Podridão cinzenta									Teldor® (1,5 kg/ha) ou Serenade® Max (2,5 a 4 Kg/ha)				Teldor® (1,5 kg/ha)			
Podridão negra						Flint® (0,15-0,25 kg/ha) ou Flint® Max (0,12 kg/ha) <sup>(5)</sup>										
Ácaros		Garbol® (5,25-15 L/ha)		Envidor® (0,3-0,4 L/ha) <sup>(7)</sup>							Envidor® (0,3-0,4 L/ha) <sup>(7)</sup>					
Cicadelídeos										Decis® Expert (125 ml/ha)						
Cochonilhas		Garbol® (5,25-15 L/ha)					Movento® O-TEQ (0,5 L/ha) <sup>(8)</sup>									
Mosca da fruta														Decis®Trap (50-80und/ha) <sup>(9)</sup>		
Traça						Coragen® (0,1-0,2 L/ha) <sup>(10)</sup>										
Adubações foliares				Complestal® 12-4-6 (2-3 L/ha)						Complestal® 5-8-10 (4-6 L/ha)						
										Complestal® Cálcio (3-4 L/ha)						
						Cenfol® (0,75-1 L/ha)				Cenfol® (0,75-1 L/ha)		Cenfol® (0,75-1 L/ha)				

(1) Antes da floração da grama; (2) Máximo 2 aplicações; (3) **Mancozan** (0,6-2 Kg/ha) ou **Cupravit** (3-6 Kg/ha); (4) Ou **Libero Top®** (0,4 Kg/ha); (5) Não efectuar mais do que 2 tratamentos com **Flint Max** e no máximo 3 com Qol's; (6) Aplicar a partir da alimpa até ao estado bago de chumbo (BBCH 69-73), realizar no máximo 1 tratamento por campanha; É também possível alternar todos os produtos indicados para o Oídio com **Enxofre Bayer WG** (4-12,5 Kg/ha); (7) Máximo de 1 aplicação; (8) ou **Movento Gold** (0,40-0,75 L/ha); (9) Em caso de aumento populacional, efetuar tratamentos inseticidas; (10) **Altacor** (50-120 g/ha), **Decis EVO** (0,25-0,7 L/ha) ou **Decis Expert** (0,13-0,17 L/ha).