








Épocas de Tratamento em Morango

Fases do Morangueiro							
Problemas	Repouso vegetativo	2 folhas	Gomos florais	Pré-floração	Floração	Crescimento dos frutos	Maturação
Infestantes gramíneas	Targa Gold (anuais 1,5 L/ha; vivazes 3 L/ha)						
Necrose do rizoma, Míldio (<i>Phytophthora spp.</i>)	Aliette Flash (2,5 kg/ha)						
Podridão cinzenta				Teldor (1,5 kg/ha) ou Serenade Max (2,5-3,5 kg/ha) ou Luna Sensation* (0,6-0,8 L/ha)			
Oídio				Enxofre Bayer (2 kg/ha) ou Luna Sensation* (0,6-0,8 L/ha)			
Ácaros (aplicação em estufa)	Oberon (0,12-0,6 L/ha)						
Afídeos	Calypso (0,2 L/ha) ou Decis Expert (65-120 ml/ha) ou Decis EVO (0,3-0,5 L/ha)						
Mosca Branca	Calypso (0,25 L/ha)						
Bicho de conta	Decis (0,3 L/ha)						
Adubações foliares e bioestimulantes	Cenfol (1 L/ha)+ Complezal 5-8-10 (2 L/ha) ou Complezal 12-4-6 (8-10 L/ha)						

* Luna Sensation apenas autorizado em estufa