

Épocas de Tratamento em Olival

Fases do Olival												
Problemas	Gomo de Inverno	Rebentação	Formação do gomo floral	Coroa mudança de cor	Formação de coroa	Aparecimento dos estames	Início da floração	Plena floração	Fruto vingado	Endurecimento do caroço	Mudança de cor	Maturação
Infestantes anuais (sistémico, contacto e residual)	Musketeer[®] (1 L/ha) (1)								Musketeer[®] (1 L/ha)(1)			
Infestantes anuais e vivazes (sistémico)	Roundup[®] UltraMax (anuais 1,5-6 L/ha; vivazes 6-10 L/ha) ou Targa[®] Gold (1-3 L/ha) (2)											
Olho de pavão	Flint[®] Max (0,15-0,2 kg/ha) ou Folicur[®] (0,24 L/ha)								Cupravit[®] (4-5 kg/ha)			
Gafa									Flint[®] (120 g/ha) (3)			
Algodão	Decis[®] Expert (75-175 ml/ha)											
Cochonilhas									Decis[®] Expert (125-175 ml/ha) ou Decis[®] Evo (0,4-0,7 L/ha)			
Traça da oliveira	Decis[®] Expert (75-125 ml/ha) ou Decis[®] Evo (0,4-0,7 L/ha)						Decis[®] Expert (75-125 ml/ha) ou Decis[®] Evo (0,4-0,7 L/ha)					
Margarónia	Decis[®] Expert (75-125 ml/ha)											
Mosca da azeitona									Decis[®] Expert (125-175 ml/ha) ou Decis[®] Evo (0,4-0,7 L/ha) ou Calypso[®] (0,2-0,25 L/ha) (4)			
Adubações foliares	Complezal[®] 12-4-6 (6 L/ha)						Cenfol[®] (0,75-1 L/ha) + Complezal[®] 5-8-10 (6 L/ha)					

Outras soluções: Traça da oliveira (Dafenil[®] Progress); Mosca da azeitona (Dafenil[®] Progress).

Notas: (1) **Musketeer[®]** controla a *Conyza* spp. especialmente aplicado ao estado de roseta da infestante; (1,5-4,7 L/ha); (2) **Targa[®] Gold**: herbicida sistémico para o controlo de gramíneas anuais, de preferência nos primeiros estados de desenvolvimento e gramíneas vivazes (ex. grama) em crescimento activo e antes da sua floração; (3) ou **Cupravit[®]**; (4) **Decis[®] Evo** ou **Decis[®] Expert** contra adultos ou **Calypso[®]** contra larvas e adultos.