

Épocas de Tratamento em Arroz

		Fases do Arroz													
Problemas		Marachas	Pré-sementeira	Sementeira	Emergência	1 Folha	2 Folhas	3 Folhas	4 Folhas	1º Filho	Afilhamento	Encanamento	Floração		
Infestantes anuais e/ou vivazes	1	RoundUp UltraMax (0,75-10 L/ha)								Nominee (65-75 ml/ha) (*)					
	2									Gulliver (40-50 g/ha) (*)					
	3									Nominee (65-75 ml/ha) (*) + Gulliver (15-20 g/ha) (*)					
Helmintosporiose e Piriculariose												Flint (0,25 Kg/ha)			

1 2 3 Processos alternativos de monda nos arrozais: 1 **Nominee** em tratamentos de pós-emergência indicado para o controlo generalizado de infestações mistas (monocotiledóneas e dicotiledóneas) especialmente direccionado para infestantes gramíneas (milhãs); 2 **Gulliver** em tratamentos de pós-emergência indicado para o controlo generalizado de infestações mistas (monocotiledóneas e dicotiledóneas) especialmente direccionado para infestantes ciperáceas (junças); 3 Para o controlo conjunto de infestantes gramíneas (milhãs) e ciperáceas (junças), com elevado grau de infestação, é possível aplicar em mistura de tanque, **Nominee** (75 ml/ha) com **Gulliver** (15-20 g/ha); (*) Sempre em mistura com o molhante **Genapol** (0,5-1 l/ha).