

## Épocas de Tratamento em Batata

| Fases da Batateira                           |   |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
|--|---|----------------------------|-----------------------|---|--|--|---------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|  | Antes da plantação                                | Abrolhamento               |                       | Crescimento                                   |  |  | Formação tubérculos | Floração | Tubérculos crescimento | Amarelecimento            | Tubérculos maduros | Armazenagem       |
| <b>Problemas</b>                             |   |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
| <b>Infestantes</b>                           | Artist (1,5-2 kg/ha)                              |                            | Targa Gold (1-3 L/ha) |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
|  |   | Challenge (2,5-3 L/ha)     |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
|  | Roundup UltraMax (1,5-10 L/ha)                    | Sencor Liquid (0,875 L/ha) |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
| <b>Rizoctónia (tratamento de tubérculos)</b> | Monceren (1 L/ton batata)                         |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
| <b>Alternariose</b>                          | Mancozan (1-2 kg/ha)                              |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
| <b>Míldio</b>                                | Mancozan (1-2 kg/ha) ou Volare (1,2-1,4 L/ha)     |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
| <b>Epitrix</b>                               | Calypso (0,15 L/ha)                               |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
| <b>Escaravelho</b>                           | Calypso (0,1-0,15 L/ha) ou Coragen (50-60 ml/ha)* |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        | Decis EVO (0,3-0,5 L/ha)* |                    |                   |
| <b>Adubações Foliares</b>                    | Cenfol (1 L/ha)<br>Complezal 12-4-6 (10 L/ha)     |                            |                       | Cenfol (1 L/ha)<br>Complezal 5-8-10 (10 L/ha) |  |  |                     |          |                        |                           |                    |                   |
| <b>Grelamento</b>                            |   |                            |                       |   |  |  |                     |          |                        |                           |                    | Birgin (1 Kg/ton) |

\* ou Decis Expert (75 mL/ha), produtos com ação secundária sobre afídeos, *Epitrix* spp. e traça da batata, quando aplicados sobre a cultura no campo.