

Melody

Autorização de venda nº 0718 concedida pela DGAV
Grânulos dispersíveis em água (WG) com 56,3% (p/p) de folpete e 9% (p/p) de iprovalicarbe.
Contém lignosulfonato de sódio sulfometilado.

130 g Lote:

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Provoca lesões oculares graves.
Suspeito de provocar cancro.
Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Provoca irritação cutânea.
Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Ficha de segurança fornecida a pedido.



Perigo

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. Eliminar o conteúdo / embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Recolher o produto derramado. Armazenar em local fechado à chave. Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. Pedir instruções específicas antes da utilização. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície. Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de protecção e os objectos contaminados. Lavar também as luvas por dentro. Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas e calças. Impedir o acesso de trabalhadores/pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Intervalo de Segurança - 42 dias em videira de uvas para vinificação; não aplicar após a floração em tomateiro.
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 808 250 143.

Ed.21215



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado.

PT05988429D



Melody®

130 g

Fungicida

indicado no combate ao míldio da vinha e míldio do tomateiro

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 56,3% (p/p) de folpete e 9% (p/p) de iprovalicarbe

Contém lignosulfonato de sódio sulfometilado

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Melody é um fungicida duplo à base de folpete (ftalimida) e de iprovalicarbe (amida do ácido carboxílico, CAA). É um fungicida de superfície e sistémico e tem actividade preventiva e curativa. Inibe vários processos metabólicos, atuando em diversos enzimas; inibe a biossíntese dos fosfolípidos e a sua deposição na parede celular (CAA).

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira (luvas para vinificação) - Míldio da vinha (*Plasmopara viticola*) - Usar a concentração de 130 g / hl, para um volume de calda de 500 a 1000 L / ha, o que corresponde a uma dose de 1,3 kg / ha em pleno desenvolvimento vegetativo da videira.

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes iniciar os tratamentos aos primeiros focos ou no estado de 7 a 8 folhas até à fase do pintor em alternância com outros produtos anti-míldio, sempre que as condições climáticas favoreçam a doença. O Melody possui uma persistência de ação de 12 dias, reduzidos para 10 dias em condições de maior pressão da doença.

Não realizar mais de 3 tratamentos por campanha, com este ou outro fungicida, contendo CAA.

Tomateiro (ar livre) - Míldio do tomateiro (*Phytophthora infestans*) - A dose recomendada é de 1,3 kg/ha. Aplicar o Melody preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas. Aplicar o produto só até à floração. O Melody possui uma persistência de ação de 10 a 12 dias, reduzidos para 10 dias em condições de maior pressão da doença.

Não realizar mais de 3 tratamentos por campanha, com este ou outro fungicida, contendo CAA.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos com este produto e/ou outro com o mesmo modo de ação (CAA, amidas do ácido carboxílico), por cultura e campanha é de 3. Alternar o uso com fungicidas com diferente modo de ação.

O Melody não deverá ser aplicado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de modo a respeitar a dose.

Volume de calda recomendado: tomateiro: 800-1000 L/ha; videira: 500-1000 L/ha.

Os resultados da aplicação deste produto, são susceptíveis de variar pela ação de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telf: 21 417 21 21

Bayer