

Melody Super

Autorização de venda nº 0700 concedida pela DGAV

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 25% (p/p) de folpete, 46,6% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio) correspondendo a 50% (p/p) de fosetil-Al e 4% (p/p) de iprovalicarbe

300 g

Lote:

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Provoca irritação ocular grave.

Suspeito de provocar cancro.

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.



Atenção

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. Eliminar conteúdo / embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Armazenar em local fechado à chave. Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho. Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Para protecção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície. Após tratamento lavar cuidadosamente o material de protecção e os objectos contaminados. Lavar também as luvas por dentro. Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar luvas / camisa de mangas compridas e calças. Impedir o acesso aos trabalhadores / pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Intervalo de Segurança - 42 dias em videira de uvas para vinificação.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos.

Telef.: 808 250 143

Ed. 21115

Os resultados da aplicação deste produto, são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado.



Melody^{super}

300 g

Fungicida

indicado no combate ao míldio da videira

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 25% (p/p) de folpete, 46,6% (p/p) de fosetil (na forma de sal de alumínio) correspondendo a 50% (p/p) de fosetil-Al e 4% (p/p) de iprovalicarbe

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Bayer

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telf: 21 417 21 21

www.bayercropscience.pt

PT85388711A



5 603782 1131105

Melody Super é um fungicida triplo à base de **folpete** (ftalimida), **fosetil-Al** (fosfonato) e **iprovalicarbe** (amida do ácido carboxílico, CAA). É um fungicida de superfície e sistémico e tem actividade preventiva e curativa. Inibe vários processos metabólicos, actuando em diversos enzimas; activa as defesas das plantas, interferindo no metabolismo fosfatado; inibe a biossíntese dos fosfolípidos e a sua deposição na parede celular (CAA).

UTILIZAÇÕES, DOSES / CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Videira (uvas para vinificação) / Míldio da vinha (*Plasmopara viticola*) - Usar a concentração de 300 g em 100 litros de água o que corresponde a uma dose de 3 kg/ha em pleno desenvolvimento vegetativo da videira. Volume da calda recomendado: 500 - 1000 L/ha.

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes iniciar os tratamentos aos primeiros focos ou no estado de 5 a 7 folhas até à fase do pintor em alternância com outros produtos anti-míldio, sempre que as condições climáticas favoreçam a doença. O **Melody Super** possui persistência de acção de 14 dias.

Nalgumas castas poderão ocorrer necroses superficiais resultantes da aplicação de **Melody Super** quando misturado com outros produtos em formulações líquidas.

Em videira, realizar no máximo 3 tratamentos por campanha, com este ou outro fungicida, contendo CAA.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos com este produto e/ou outro com o mesmo modo de acção (CAA, amidas do ácido carboxílico), **por campanha é de 3**. Alternar o uso com fungicidas com diferente modo de acção. O **Melody Super** não deverá ser aplicado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária, juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.