

## Monceren

Autorização provisória de venda nº 3851 concedida pela DGAV

Suspensão concentrada (SC) para tratamento de sementes com 250 g/l ou 24% (p/p) de pencicurão

1 L

Lote:

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos nefastos duradouros.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 808 250 143

Ed. 20315-A



valorfita

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



5 1603782 1131129

PT6113604D



# monceren®

1 L

## Fungicida

indicado para desinfecção de tubérculos da batateira contra *Rhizoctonia solani*

Suspensão concentrada (SC) para tratamento de sementes com 250 g/l ou 24% (p/p) de pencicurão

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



O **Monceren** é um fungicida de superfície, não sistémico, destinado à desinfecção de batata de semente para combate à *Rhizoctonia solani*.

## UTILIZAÇÕES E CONCENTRAÇÕES DE EMPREGO

**Batata semente** (*Rhizoctonia solani*): Utilizar 1 litro de **Monceren** por 1000 kg de batata semente, pulverizando os tubérculos imediatamente antes da plantação. A pulverização deve ser efectuada a muito baixo volume, usando cerca de 20 a 40 litros de água por tonelada de tubérculos, quando não se disponha de maquinaria especializada. O volume mais elevado de calda apenas deve ser usado, à plantação, quando se utiliza um pulverizador acoplado ao plantador.

A plantação dos tubérculos desinfectados deverá ser realizada imediatamente após a desinfecção dos mesmos porque o tratamento por via húmida pode favorecer o desenvolvimento de podridões dos tubérculos.

## MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.



Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco

Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
Rua Quinta do Pinheiro, 5  
2794-003 CARNAXIDE  
Telf: 214 172 121



Bayer CropScience