

Melody® Cobre

Autorização de venda nº 0790 concedida pela DGAV

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 40,6% (p/p) de cobre (sob a forma de oxiclreto) e 8,4% (p/p) de iprovalicarbe

150 g Lote:

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Nocivo por ingestão.

Provoca irritação ocular grave.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Contém 1-dodecil-2-pirrolidona. Pode provocar uma reacção alérgica.



Atenção

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Usar luvas de protecção, vestuário de protecção e protecção ocular. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Usar luvas e vestuário de protecção durante a preparação da calda e aplicação do produto. Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 5 metros em hortícolas e 10 metros em vinha. Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas. Após o tratamento lavar bem o material de protecção e os objetos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. Intervalo de Segurança: 7 dias em alface (ar livre), cebola (ar livre) e tomateiro de (estufa); 20 dias em tomateiro (ar livre) e 21 dias em videira. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 808 250 143 Ed. 20616

Os resultados da aplicação deste produto, são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado.



Bayer

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telf: 21 417 21 21
www.bayercropscience.pt

PT79274319C



Melody[®] cobre

150 g

Fungicida

indicado no combate aos míldios da videira, tomateiro, cebola e alface

Grânulos dispersíveis em água com 40,6% (p/p) de cobre (sob a forma de oxiclreto) e 8,4% (p/p) de iprovalicarbe

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

O **Melody Cobre** é um fungicida misto que contém cobre e iprovalicarbe. O cobre é um fungicida inorgânico de superfície, tem actividade preventiva e inibe vários processos metabólicos actuando sobre diversas enzimas. O iprovalicarbe é a amida do ácido carboxílico (CAA), que inibe a síntese dos fosfolípidos, actua no processo de síntese da parede celular dos fungos. É um fungicida penetrante com acção curativa e anti-esporulante.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Míldio da videira (*Plasmopara viticola*) - a dose de emprego é de **1,5 kg/ha**.

Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência aplicar o **Melody Cobre** apenas após a floração. O produto confere protecção por períodos de 10 a 12 dias, devendo utilizar-se o período mais curto em condições de maior pressão da doença. Volume de calda recomendado: 1000 L/ha.

Míldio do tomateiro (*Phytophthora infestans*) (ar livre e estufa) - A dose de emprego é de **1,5 kg/ha**. Pode-se aplicar o produto após a crise de transplantação até à maturação dos frutos. O produto confere protecção por períodos de 10 a 12 dias, devendo utilizar-se o período mais curto em condições de maior pressão da doença. Volume de calda recomendado: 600 - 1000 L/ha.

Míldio da alface (*Bremia lactucae*) (ar livre) - A dose de emprego é de **1,5 kg/ha**.

O **Melody Cobre** pode aplicar-se a partir da 4ª folha até ao final da cultura. O produto confere protecção por períodos de 10 a 12 dias, devendo utilizar-se o período mais curto em condições de maior pressão da doença. Volume de calda recomendado: 800 - 1000 L/ha.

Míldio da cebola (*Peronospora destructora*) (ar livre) - A dose de emprego é de **1,5 kg/ha**.

O **Melody Cobre** pode aplicar-se a partir da 3ª folha até ao final da cultura. O produto confere protecção por períodos de 10 a 12 dias, devendo utilizar-se o período mais curto em condições de maior pressão da doença. Volume de calda recomendado: 600 - 1000 L/ha.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não efectuar mais de 3 tratamentos, por campanha e por cultura, com este ou outro fungicida com o mesmo modo de acção (fungicidas CAA). O **Melody Cobre** não deverá ser aplicado nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto após aplicações repetidas deste ou de outros produtos com o mesmo modo de acção (CAA).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

Evitar deixar a calda em repouso.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

