



# PREVICUR<sup>®</sup> ENERGY

300 ml

## Fungicida

Indicado no controlo da murchidão das plantas em viveiros (hortícolas e ornamentais), em rega gota-a-gota (hortícolas) e dos mildios da alface e espinafre.

Solução concentrada (SL) com 310 g/L ou 27,68% (p/p) de fosetil (na forma de sal de sódio) e 530 g/L ou 47,32% (p/p) de propamocarbe (na forma de hidrocloreto)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE  
AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS  
PARA A SAÚDE HUMANA  
E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES  
DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA  
DO ALCANCE  
DAS CRIANÇAS



## Previcur Energy<sup>®</sup>

Autorização de venda n.º 0450 concedida pela DGAV

Solução concentrada (SL) com 310 g/L ou 27,68% (p/p) de fosetil (na forma de sal de sódio) e 530 g/L ou 47,32% (p/p) de propamocarbe (na forma de hidrocloreto)

300 ml

Lote:

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo / embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Nos tratamentos em pré-plantação em viveiros e sobre substrato artificial, os restos da calda deverão ser tratados como efluentes e sujeitos a tratamento prévio. Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. Intervalo de Segurança: 14 dias em alface (ar livre) e espinafre (não aplicar em estufa); 21 dias em alface em estufa. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 808 250 143.

Ed. 20816



## Atenção

Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
Rua Quinta do Pinheiro, 5  
2794-003 CARNAXIDE  
Telf: 21 417 21 21  
www.bayercropscience.pt

# Bayer



PT79367066C

5 603782 131358

O **Previcur Energy** é um fungicida sistémico com fosetil, do grupo dos fosfanatos, que activa as defesas das plantas, interferindo no metabolismo fosfatado e com propamocarbe, do grupo dos carbamatos, que altera a permeabilidade das membranas celulares, inibindo a síntese dos ácidos gordos.

O produto possui actividade preventiva e curativa. Actua contra doenças causadoras da murchidão das plantas causadas por fungos dos géneros *Pythium* e *Phytophthora* e para o controlo do míldio de algumas culturas hortícolas.

## **UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

### **Viveiros (tabuleiros)**

Para culturas hortícolas (tomateiro, beringela, pimenteiro, pepino, aboborinha/courgette, abóbora, meloeiro, melancia, couve-flor, couve bróculo e couves de repolho, alface, mizuna, rúcula e rúcula selvagem) e ornamentais (craveiro, amor-perfeito, sardinheiras, estrelícias, antúrios, próteas e orquídeas) contra fungos causadores da murchidão das plantas *Pythium* e *Phytophthora*:

Realizar 1 aplicação logo após a sementeira a uma dose de 3 ml/m<sup>2</sup>. Repetir se necessário, não ultrapassando as duas aplicações por cultura. Humedecer o solo antes da aplicação.

### **Local definitivo – rega gota-a-gota**

Para as culturas hortícolas tomateiro, beringela, pimenteiro, pepino, aboborinha/courgette, abóbora, meloeiro e melancia (estufa ou ar livre) contra fungos causadores da murchidão das plantas *Pythium* e *Phytophthora*:

Realizar 1 aplicação logo após a transplantação a uma dose de 2-3 L/ha em rega gota-a-gota.

### **Local definitivo – pulverização foliar**

Para o combate ao míldio da alface, em estufa ou ar livre (*Bremia lactucae*) e ao míldio do espinafre (ar livre) (*Peronospora farinosa*):

Realizar 1 aplicação preventiva a uma dose de 2,5 L/ha. No caso da alface, se necessário, repetir 10 a 15 dias depois (máximo de 2 aplicações nesta cultura). No caso do espinafre só é permitida 1 aplicação.

### **PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS**

Tendo em conta a elevada sensibilidade de algumas culturas ornamentais, recomenda-se a realização de um pequeno ensaio preliminar para testar uma eventual fitotoxidade, numa ou duas plantas, antes da utilização generalizada do **Previcur Energy**.

### **MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA**

No depósito onde se prepara a calda para a pulverização deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

## MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação em viveiros (tabuleiros) e aplicação no local definitivo – rega gota-a-gota – ver condições de utilização.

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha devendo estes serem entregues num centro de recepção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



# PREVICUR<sup>®</sup> ENERGY

300 ml

## Fungicida

Indicado no controlo da murchidão das plantas em viveiros (hortícolas e ornamentais), em rega gota-a-gota (hortícolas) e dos mildios da alface e espinafre.

Solução concentrada (SL) com 310 g/L ou 27,68% (p/p) de fosetil (na forma de sal de sódio) e 530 g/L ou 47,32% (p/p) de propamocarbe (na forma de hidrocloreto)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



## Previcur Energy<sup>®</sup>

Autorização de venda n° 0450 concedida pela DGA

Solução concentrada (SL) com 310 g/L ou 27,68% (p/p) de fosetil (na forma de sal de sódio) e 530 g/L ou 47,32% (p/p) de propamocarbe (na forma de hidrocloreto)

300 ml

Lote:

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo / embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Nos tratamentos em pré-plantação em viveiros e sobre substrato artificial, os restos da calda deverão ser tratados como efluentes e sujeitos a tratamento prévio. Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. Intervalo de Segurança: 14 dias em alface (ar livre) e espinafre (não aplicar em estufa); 21 dias em alface em estufa. Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 808 250 143.

Ed. 20816



## Atenção

Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
Rua Quinta do Pinheiro, 5  
2794-003 CARNAXIDE  
Telf: 21 417 21 21  
www.bayercropscience.pt

# Bayer



PT79367066C

5 603782 131358