

Decis Trap é uma armadilha para a captura de adultos da mosca da fruta ou Mosca do Mediterrâneo (*Ceratitis capitata*). A armadilha contém um atrativo com três componentes (acetato de amónio, hidrocloreto de trimetilamina e cadaverina) e uma película impregnada com deltametrina na parte interior da tampa.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Decis Trap pode utilizar-se para a captura de mosca da fruta (*Ceratitis capitata*) em citrinos, pomóideas (maceira, pereira, pera-nashi e mar-meleiro), prunóideas (pessegueiro, nectarina, damasqueiro, ameixeira e cerejeira), videira e mangueira.

Recomenda-se uma densidade de 50 a 80 armadilhas por hectare (dependendo das culturas e do nível de ataque).

Colocar as armadilhas 30 a 40 dias antes da mudança de cor dos frutos, ou quando 1 adulto/armadilha/dia é capturado nas armadilhas de monitorização, ou 50 dias antes da data provável da colheita.

As armadilhas devem ser distribuídas de forma homogênea pela parcela a proteger podendo reforçar-se um pouco mais nas bordaduras, especialmente por onde habitualmente entra a mosca da fruta (*Ceratitis capitata*).

As armadilhas devem ser colocadas a cerca de 1,40 a 1,80 m de altura da copa das árvores, do lado virado a sul, mas tendo o cuidado de não as expor diretamente ao sol.

É necessário proceder à monitorização da praga afim de detetar aumentos súbitos dos níveis populacionais e assim aplicar outros meios de luta, nomeadamente um tratamento com inseticida.

A persistência de ação é de 120 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

É necessário proceder à monitorização da praga a fim de detetar aumentos súbitos dos níveis populacionais e assim aplicar outros meios de luta, nomeadamente um tratamento com inseticida.

Os resultados da aplicação deste produto, são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



Contém **20x1**

20 Unidades
Isco pronto a usar (RB) contendo 0,015 g de deltametrina/armadilha

Armadilha para captura da Mosca do Mediterrâneo (*Ceratitis capitata*) em diversas culturas

GRUPO 3 INSETICIDA

Autorização de Venda nº 0656 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal) Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
<https://cropscience.bayer.pt>



ATENÇÃO

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Evitar a libertação para o ambiente.

Usar luvas de proteção.

Eliminar conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

**Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV).
Telef.: 800 250 250.**

Ed. 21120

[UFI: YNM2-H05J-W00N-WJ7R]



Depois de inutilizadas, a embalagem das armadilhas e as recargas, assim como as armadilhas, deverão ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Bayer



5 603782 110988

PT81712042D