



Unicur®

Contém **5 L**

Concentrado para emulsão (EC) com 100 g/L de fluoxastrobina e 100 g/L de protioconazol

Fungicida

indicado para combater o mildio e a estenfiliose da cebola

GRUPO	11	FUNGICIDA
GRUPO	3	FUNGICIDA

Autorização de Venda N.º 1388 concedida pela DGAV
N.º Lote e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da
Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 214 172 121
<https://cropsience.bayer.pt>

PT86262703C

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Provoca lesões oculares graves.

Nocivo por inalação.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Evitar respirar a nuvem de pulverização.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Usar luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial.

EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Recolher o produto derramado.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Contém fluoxastrobina. Pode provocar uma reação alérgica.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície.

Mantém em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Na entrada dos trabalhadores, às zonas tratadas logo a seguir à aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

O aplicador deverá usar: luvas adequadas, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas e botas de borracha durante a aplicação do produto.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação AntiVenenos (CIAV).

Telef.: 800 250 250.

Ed. 21220

[UFI: MEC0-G0JU-C00U-T9JY]



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



PERIGO

UNICUR é um fungicida que associa a fluoxastrobina (derivado sintético das estrobilurinas naturais, inibindo a respiração mitocondrial dos fungos) e o protioconazol (pertencente ao grupo dos triazóis, atuando na desmetilação da síntese dos esteróis - DM). É um fungicida sistêmico com atividade preventiva e curativa.

UTILIZAÇÃO, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CEBOLA: *Estenfiliose* (*Stemphylium* spp.) e *Mildio* (*Peronospora destructor*): **1-1,25 L/ha.**

Aplicar preventivamente, na presença de condições favoráveis à doença, desde as 5 folhas verdadeiras até ao início de inclinação da folhagem (10% de folhas inclinadas). Se necessário, repetir após 10 dias.

Intervalo de Segurança: 21 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, efetuar um máximo de 2 aplicações por ciclo cultural e conjunto das doenças, com **UNICUR** ou outros produtos com DMI's. Alternar o uso deste fungicida com produtos de outro modo de ação.

Aplicar o **UNICUR** apenas em campos de cebola com colheita mecânica.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda, deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

O produto deve ser aplicado com trator com cabina.

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Volume de Calda Recomendado: 300-800 L/ha.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



516037821131679

PT86217465C

Bayer