



# REQUIEM® prime

Contém **10 L**

Concentrado para emulsão (EC) com 135,5 g/L ou 14,42 % (p/p) de uma mistura de terpenóides (QRD 460)

## Inseticida-acaricida

para controlo de moscas-brancas, aranha-amarelo e tripses em culturas protegidas

Autorização de venda N.º 1370 concedida pela DGAV

N.º Lote e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da Autorização de Venda:  
Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso  
2790-255 CARNAXIDE  
Telef.: 21 417 21 21  
<https://croppscience.bayer.pt>

PT85397308E

O **Requiem Prime** é um inseticida-acaricida que contém uma mistura de terpenóides naturais (QRD 460), presentes no óleo essencial da planta aromática *Dysphania (=Chenopodium) ambrosioides*. O produto atua por contacto, degradando as cutículas finas dos insetos e ácaros, conduzindo à sua imobilidade e dificuldades respiratórias.

### UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura	Pragas	Concentração (e Dose Máxima)	Época e Condições de Aplicação (N.º Máx. Aplicações)	Inter. Segur.
Cucurbitáceas (abóbora, aboborinha / courgette, melancia, meloeiro e pepino) e Solanáceas (beringela, pimenteiro e tomateiro) (culturas de estufa)	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0,65 L/hl (nunca ultrapassar a dose de 9,75 L/ha por aplicação)	Tratar no início de aparecimento da praga.  Recomenda-se sempre a realização de 2 tratamentos consecutivos com intervalo mínimo de 7 dias.  (máximo de 12 aplicações)	Não aplicável
	Moscas brancas ( <i>Bemisia tabaci</i> e <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )			
	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )			

**VOLUME DE CALDA RECOMENDADO**  
500-1500 L/ha em cucurbitáceas, frutos tropicais, plantas ornamentais e solanáceas; 500-1000 L/ha em acelga/beterraba, beldroega, espinafre e salicórnica, plantas aromáticas, similares de alface e infusões de plantas; 200-1200 L/ha em bagas e pequenos frutos, morangoeiro e viveiros de ornamentais.

**PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS**  
**Respeitar 21 dias entre blocos de duas aplicações.** Em cucurbitáceas, morangoeiro e solanáceas, respeitar um intervalo mínimo de 7 dias antes de efetuar aplicações foliares à base de estrobilurinas ou fluopirame. Em pimento, respeitar também um intervalo mínimo de 7 dias antes de efetuar aplicações foliares à base de indoxacarbe.  
Recomenda-se aplicar o produto numa pequena área da cultura, de forma a verificar a eventual fitotoxicidade que possa ocorrer nessa cultura/variedade, antes de pulverizar toda a parcela. Sendo um produto de contacto, é essencial que a pulverização garanta uma distribuição uniforme da calda fitossanitária, favorecendo o contacto do produto com a praga alvo.  
A aplicação do **Requiem Prime** deve ser alternada com produtos de diferentes modos de ação.  
**Aplicar só em estufas de estrutura permanente. Não misturar com outros produtos.**

**MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA**  
Na preparação da calda, deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

**MODO DE APLICAÇÃO**  
Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) e da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.  
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.  
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas, aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

• Ficha de segurança fornecida a pedido. • Líquido e vapor inflamáveis. • Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. • Pode provocar uma reação alérgica cutânea. • Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. • Manter afastado do calor, superfícies quentes, fagulha, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. • Utilizar equipamento elétrico, de ventilação, de iluminação (...) à prova de explosão. • Tomar medidas para evitar acumulação de cargas electrostáticas. • Evitar respirar a nuvem de pulverização. • Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. • Usar luvas de proteção e vestuário de proteção. • EM CASO DE INGESTÃO, contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. • NÃO provocar o vômito. • Em caso de irritação ou erupção cutânea consulte um médico. • Retirar a roupa contaminada e lavá-la, antes de a voltar a usar. • Armazenar em local fechado à chave. • Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. • Agitar a solução de pulverização durante a sua utilização. • ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. • Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telef.: 800 250 250 • Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. • Arejar bem as estufas tratadas, até à secagem do pulverizado, antes de nelas voltar a entrar. • O aplicador deverá usar luvas de proteção e vestuário de proteção, durante a preparação da calda e aplicação do produto. • Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro. Ed. 20819



PERIGO

(UFI: W7A0-DOW9-200W-JHE2)



Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

**USOS MENORES (UM)** - A eficácia e fitotoxicidade resultantes destes usos menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

Cultura	Pragas	Concentr. (e Dose Máxima)	Época e Condições de Aplicação (N.º Máx. Aplicações)	Inter. Segur.
Acelga / Beterraba (folhas), Beldroega, Espinafre (culturas de estufa)	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0,65 L/hl	Tratar no início de aparecimento da praga.  Recomenda-se sempre a realização de 2 tratamentos consecutivos com intervalo mínimo de 7 dias.  (máximo de 12 aplicações)	Não aplicável
	Moscas brancas ( <i>Bemisia tabaci</i> e <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )			
Bagas e Pequenos Frutos* (amoras, framboesas, groselhas e mirtilos/arandos), (culturas de estufa)	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	0,65 L/hl	Tratar apenas até ao final da floração.	Não aplicável
	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )			
Plantas Aromáticas* (aiço (folhas), alectrim, aneto, cabolinho, crefolio, coentros, estração, feno grego, funcho de folhas, hortelã, louro (folhas), manjerição, milefólio, orégãos, salsa, salva e tomilho), (culturas de estufa)	Moscas brancas ( <i>Bemisia tabaci</i> e <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	*7,8 L/ha (bagas e pequenos frutos)	Tratar apenas até ao final da floração.	Não aplicável
	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )			
Salicórnica* e Similares de Alface* (agrião, alface de cordeiro, chicória/escarola, mostardas, rúcula, culturas colhidas até à fase fenológica de 6-8 folhas verdadeiras: couves, mizuna, komatsuna e rúcula selvagem) (culturas de estufa)	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0,65 L/hl (nunca ultrapassar a dose de 9,75 L/ha por aplicação)	Tratar no início de aparecimento da praga.	Não aplicável
	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )			
Frutos Tropicais (ananaseiro, bananeira, mangaieira e papaieira) (culturas de estufa)	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )	0,65 L/hl	Tratar no início de aparecimento da praga.	Não aplicável
	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )			
Infusões de Plantas (flores, folhas e raízes de: camomila, hibisco, jasmim, rosa e tilia) (culturas de estufa)	Moscas brancas ( <i>Bemisia tabaci</i> e <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	0,65 L/hl	Tratar no início de aparecimento da praga.	Não aplicável
	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )			
Morangoeiro (estufa)	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	0,65 L/hl (nunca ultrapassar a dose de 7,8 L/ha por aplicação)	Tratar no início de aparecimento da praga.	Não aplicável
	Ácaros ( <i>Tetranychus urticae</i> )			
Plantas Ornamentais* (para produção de folha, flor e/ou fruto, em corte ou em vaso) e Viveiros de Ornamentais* (culturas de estufa)	Moscas brancas ( <i>Bemisia tabaci</i> e <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	0,65 L/hl (nunca ultrapassar a dose por aplicação de: *9,75 L/ha (plantas ornamentais)	Tratar no início de aparecimento da praga.	Não aplicável
	Tripses ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )			



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de recolha autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Bayer

PT85379712C