

Decis Trap SUZUKII é uma armadilha utilizada no método de captura em massa p/a drosófila-de-asa-manchada (*Drosophila suzukii*).

Esta armadilha contém um atrativo específico e uma película impregnada com deltametrina na parte inferior da tampa. As armadilhas distribuídas de forma uniforme na cultura atraem o inseto para o seu interior e a deltametrina provoca-lhes a morte. O formato da armadilha permite que o inseticida esteja confinado na estrutura, impossibilitando o seu contacto com o ambiente, o utilizador ou a cultura agrícola.

UTILIZAÇÕES, DENSIDADE, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Decis Trap SUZUKII pode ser utilizado em todas as culturas de ar livre e estufa (se aplicável) de **actinídia/kiwi, amoreira, diospireiro, figueira, pequenos frutos** (amoras-silvestres, arandos-azuis/mirtilos-azuis, arandos-vermelhos/mirtilos-vermelhos, framboesas, groselheiras e morangueiros), **prunóideas** (ameixeira, cerejeira, damasqueiro, ginjeira e nectarina/pessegueiro) e **videira** (uva de mesa e uva de vinho). **Instalar as armadilhas durante o desenvolvimento dos frutos**, antes destes ficarem suscetíveis ao ataque da praga (antes da mudança de cor dos frutos ou 50 dias antes da colheita) e **quando se iniciar o voo dos adultos** (antes da postura dos ovos).

Utilizar a densidade de **50-100 armadilhas/ha**, ajustando-a conforme a intensidade da praga e o uso de estratégias complementares. Efetuar uma distribuição homogênea e uniforme das armadilhas. Reforçar a distribuição das armadilhas nas bordaduras da parcela, no caso de culturas vizinhas e/ou situações particulares. **Intervalo de Segurança:** não aplicável.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Proceder à monitorização da praga, de forma a detetar aumentos súbitos dos níveis populacionais e intervir com outros meios de luta, nomeadamente tratamentos inseticidas.

MODO DE APLICAÇÃO

As armadilhas estão prontas a ser utilizadas e não precisam de qualquer manipulação manual.

Não abrir/perfurar as bolsas que contêm o atrativo. As armadilhas têm uma persistência de ação de 100 dias (variável consoante as condições ambientais).

Culturas Altas: Prender a armadilha com um arame/gancho na parte superior da árvore, dentro da vegetação. Respeitar a distância recomendada de 10 m entre armadilhas.

Culturas Baixas: Colocar a armadilha acima da vegetação (20-30 cm acima das plantas).



Contêm

20x1

20 Unidades

Armadilha pronta a usar (XX) com 15 mg deltametrina/armadilha

Armadilha utilizada p/captura em massa da drosófila-de-asa-manchada (*Drosophila suzukii*)

GRUPO 3 INSETICIDA

Autorização de Venda N.º 1960 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

Este produto pode ser utilizado em Modo de Produção Biológico

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Drosófila-de-asa-manchada (*Drosophila suzukii*)



5 1603782 1131938

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Líquido e vapor facilmente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. Conservar em ambiente fresco. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas, proteção ocular e vestuário de proteção. **EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. Se aplicável, retirar as lentes de contacto e continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Em caso de incêndio: Para o extinguir, utilizar água/areia. Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. Ficha de segurança fornecida a pedido. Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. Proteger do gelo. O produto pode ser armazenado durante 6 meses, à temperatura ambiente. Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. **Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef.: 800 250 250.**

Ed. 20322

[UFI: RUM2-H0JC-H00N-77DV]



valorfit

Depois de inutilizadas, a embalagem das armadilhas e as recargas, assim como as armadilhas, deverão ser entregues num ponto de retoma autorizado.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

Titular da Autorização de Venda:

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vítor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 214 172 121
<https://croscience.bayer.pt>



ATENÇÃO

Bayer

PT85803816B