

Armadilha para o método "Atração e Morte" destinado ao controlo da mosca-da-azeitona (*Bactrocera oleae*).

O **decis® trap OLEAE** é uma armadilha que contém isco pronto a usar com atrativo alimentar e um inseticida piretróide (deltametrina) que atua por contacto e ingestão, impregnado na tampa da armadilha.

Os adultos de mosca-da-azeitona são atraídos pelo atrativo alimentar e ao contactarem com a superfície do dispositivo, são afetados pela ação inseticida.

A deltametrina atua ao nível do sistema nervoso dos insetos como modelador dos canais de sódio (IRAC MoA grupo 3A).

UTILIZAÇÕES, DENSIDADE, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

decis® trap OLEAE pode ser utilizado em todas as culturas de ar livre e estufa (se aplicável) de **oliveira** (*Olea europaea*). Colocar antes do início do voo (primeiras capturas), no início do endurecimento do caroço da azeitona, até à colheita.

decis® trap OLEAE é utilizado para a captura da mosca-da-azeitona (*Bactrocera oleae*), pelo método de atração e morte.

Recomenda-se uma densidade de 5-100 armadilhas/ha, ajustando-a conforme a intensidade da praga e o uso de estratégias complementares. Efectuar uma distribuição homogênea e uniforme das armadilhas. Reforçar a distribuição das armadilhas na bordadura da parcela, no caso de culturas vizinhas e/ou situações particulares.

As armadilhas também podem ser utilizadas apenas para monitorização (1-3 armadilhas/ha).

Intervalo de Segurança: não aplicável.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Proceder à monitorização da praga, de forma a detetar aumentos súbitos dos níveis populacionais e intervir com outros meios de luta, nomeadamente tratamentos inseticidas.

MODO DE APLICAÇÃO

As armadilhas estão prontas a ser utilizadas e não precisam de qualquer manipulação manual. Não abrir/perfurar as bolsas que contêm o atrativo. As armadilhas têm uma persistência de ação de 180 dias, variável consoante as condições ambientais.

As armadilhas devem ser instaladas antes do endurecimento do caroço da azeitona (geralmente no mês de junho). Prender as armadilhas a 1,4-1,8 m de altura (do solo), virando-as para sul-sudoeste. A sua distribuição deverá ser uniforme e adaptada à densidade de plantação. Deverá intensificar-se a distribuição das armadilhas na bordadura, especialmente no local de entrada do inseto ou na fronteira com olivais abandonados, respeitando o n.º máximo de armadilhas/ha.

Caso o dispositivo de plástico esteja danificado/partido ou seja proveniente de embalagens não fechadas, as armadilhas não deverão ser utilizadas.



decis®

trap

Contêm

20x1

20 Unidades

Armadilha pronta a usar (XX) com 15 mg deltametrina/armadilha

Armadilha para o método «Atração e Morte» destinado ao controlo da mosca-da-azeitona (*Bactrocera oleae*)

GRUPO 3 INSETICIDA

Autorização de Venda N.º 2141 concedida pela DGAV

Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



Mosca-da-azeitona (*Bactrocera oleae*)

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar a libertação para o ambiente.

Recolher o produto derramado.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Mantener em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

O aplicador deverá usar luvas adequadas durante o manuseamento das armadilhas.

Depois da utilização do produto, lavar todo o material de proteção.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Tel.: 800 250 250 Ed. 20523



ATENÇÃO

UFI: VXR2-TOPE-700D-YMCY



A embalagem das armadilhas e das recargas, depois de inutilizadas, assim como as armadilhas, depois de usadas, deverão ser entregues num ponto de retoma autorizada.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.



5 1603782 1132027

Titular da Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 214 172 121
<https://croscience.bayer.pt>

Bayer

PT85837923A