



# Folicur®

Contém **20 L**

Emulsão óleo em água (EW) com 250 g/L ou 25,77% (p/p) de tebuconazol

## Fungicida

preventivo e curativo para combater:  
Oídio e ferrugens do trigo e da cevada, Fusariose da espiga e septoriose do trigo,  
Helminthosporiose e rincosporiose da cevada e Olho-de-pavão da oliveira

**GRUPO 3 FUNGICIDA**

Autorização de Venda N.º 1524 concedida pela DGAV  
Lote N.º e Data de Produção: impressos na embalagem

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Titular da  
Autorização de Venda:  
Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 – 4.º Piso  
2790-255 CARNAXIDE  
Telef.: 21 417 21 21  
<https://cropscience.bayer.pt>

PT79259247E

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Nocivo por ingestão ou inalação.  
Provoca lesões oculares graves.  
Suspeito de afetar o nascituro.  
Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
Ficha de segurança antes da utilização.  
Pedir instruções específicas antes da utilização.  
Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.  
Evitar respirar a nuvem de pulverização.  
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.

EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes às águas de superfície.

Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.

O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e quando em contacto com as superfícies contaminadas; usar luvas, vestuário de proteção e botas de borracha durante a aplicação do produto.

Após o tratamento, lavar bem o material de proteção, tendo especial cuidado em lavar as luvas por dentro.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas, até à secagem do pulverizado.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV).

Telef.: 800 250 250.

Ed. 20220

[UFI: NX80-T0JA-G00G-MDP3]



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



5 603782 113113 6



PERIGO

Folicur é um fungicida do grupo dos triazóis, sistémico e com ação preventiva e curativa à base de tebuconazol, inibidor da biossíntese dos esteróis na desmetilação (DMI).

### UTILIZAÇÃO, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

**TRIGO:** Septoriose (*Zymoseptoria tritici*), oídio (*Blumeria graminis*), ferrugem castanha (*Puccinia recondita*), ferrugem amarela (*Puccinia striiformis*) e fusariose da espiga (*Fusarium* spp.).

**CEVADA:** Oídio (*Blumeria graminis*), helmintosporiose (*Pyrenophora teres*), ferrugem castanha (*Puccinia hordei*) e rincosporiose (*Rhynchosporium secalis*).

Efetuar uma única aplicação por cultura com a dose de 1 L/ha em tratamento preventivo, ao aparecimento dos primeiros sintomas, de modo a manter sãs as duas folhas superiores (folhas "bandeira"). Em anos muito favoráveis ao desenvolvimento da doença, efetuar outro tratamento entre o início do encanamento e o fim do espigamento, com um fungicida de outro modo de ação.

No caso da fusariose da espiga do trigo, o tratamento deverá ser efetuado no início da floração ou na antese quando se prevejam condições favoráveis (chuva e temperaturas amenas).

**OLIVEIRA:** Olho-de-pavão (*Venturia oleaginea*)

Efetuar uma única aplicação com a dose de 0,6 L/ha em pré-floração, no início da primavera, até ao início da abertura dos gomos florais, caso se verifique o aparecimento da doença e a existência de condições meteorológicas favoráveis. Se necessário, prosseguir os tratamentos no outono com produtos aprovados para a finalidade nesse período.

**Intervalo de Segurança:** 35 dias em trigo e cevada; não aplicável em oliveira (coberto pela época de aplicação).

Em oliveira, trigo e cevada, realizar o máximo de 1 tratamento por ano com este produto.

Em certas condições, este produto pode provocar necroses difusas nas folhas dos cereais tratados, sem efeitos negativos na produtividade.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar produtos que contenham DMI's mais de 2 vezes em oliveira e 1 vez em cereais (trigo e cevada), no conjunto das doenças. Alternar o uso deste produto com fungicidas de outro modo de ação.

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda, juntar metade do volume de água adequada para a pulverização prevista. Juntar a quantidade necessária de produto e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas), com especial cuidado na uniformidade de distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

**Volume de Calda Recomendado:** 200-400 L/ha em cereais e 1000 L/ha em oliveira

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

PT79371691E

Bayer