



caLypso®

Um virar de página no controlo das pragas

- Elevada eficácia no controlo do escaravelho da batateira, bichado da macieira e pereira, afídeos da macieira, pereira, cerejeira, ameixeira, pessegueiro e morangueiro, psila da pereira e ainda mosca da azeitona
- Modo de acção inovador, sem resistências cruzadas com outras famílias insecticidas
- Ampla “janela” de aplicação
- Selectivo para abelhas
- Autorizado em Protecção Integrada














caLypso®

Um virar de página no controlo das pragas

Efeito rápido e prolongado, no controlo de um largo espectro de pragas picadoras-sugadoras (afídeos e psila), mastigadoras (bichado e escaravelho) e mosca da azeitona, entre outras.

- Acção por contacto e ingestão, com propriedades sistémicas e translaminares.
- Acção inovadora e eficaz no controlo de insectos resistentes a outros insecticidas.
- Novo modo de acção no controlo do bichado, psila e mosca da azeitona.
- Acção ovicida e larvicida no controlo do bichado.
- Extraordinário efeito de choque no escaravelho da batateira.
- Elevada eficácia a baixas doses.
- Inócuo para abelhas.

Cultura	Problema	Concentração	Dose	Modo de emprego	Intervalo de segurança	PI
Ameixeira	Afídeos	15-20 ml/hl	0,15-0,2 L/ha	Aplicar CaLypso ao início dos ataques.	2 semanas	
Batateira	Escaravelho	12,5-19 ml/hl***	0,1-0,15 L/ha	Aplicar CaLypso ao aparecimento das primeiras larvas. Tem também acção aficida. Realizar no máximo 2 aplicações.	3 semanas	
Cerejeira	Afídeos	20 ml/hl	0,2 L/ha	Aplicar CaLypso ao início dos ataques.	2 semanas	
Damasqueiro (alperceiro)	Afídeos	25 ml/hl	-	Aplicar CaLypso ao início dos ataques. No máximo 2 aplicações.	2 semanas	
	Bichado					
Framboesa	Afídeos	20 ml/hl	-	Aplicar CaLypso ao início dos ataques, antes da floração e depois do vingamento dos cachos. Máximo de 3 aplicações.	3 dias	
Groselheira	Afídeos	20 ml/hl	-	Aplicar CaLypso ao início dos ataques, antes da floração e depois do vingamento dos cachos. Máximo de 3 aplicações.	3 dias	
Macieira	Afídeos	25 ml/hl	0,25 L/ha	Aplicar CaLypso ao início dos ataques.	2 semanas	
	Bichado	20 ml/hl	0,2 L/ha	Aplicar CaLypso ao início da eclosão das larvas. Realizar no máximo 2 aplicações e com um intervalo mínimo de 2 a 3 semanas.		
Morangueiro	Afídeos	40 ml/hl	0,2 L/ha	Aplicar CaLypso ao início dos ataques.	3 dias	
Oliveira**	Mosca da azeitona	20-25 ml/hl	0,2-0,25 L/ha	Aplicar CaLypso segundo as indicações do Serviço de Avisos ou quando se observarem as primeiras posturas. Usar a dose maior quando a pressão da praga for superior e em olivais de azeitona de mesa. Repetir se necessário 21 dias depois.	2 semanas	
Pereira	Bichado	20 ml/hl	0,2 L/ha	Aplicar ao início da eclosão das larvas. Realizar no máximo 2 aplicações e com um intervalo mínimo de 2 a 3 semanas.	2 semanas	
	Afídeos			Aplicar CaLypso ao início dos ataques.		
	Psila					
Pessegueiro	Afídeos	15-20 ml/hl	0,15-0,2 L/ha	Aplicar CaLypso ao início dos ataques.	2 semanas	

Volume de calda recomendado para pomóideas, prunóideas e oliveira: 1000 L/ha; para batateira: 700-800 L/ha e para morangueiro: 500 L/ha. No caso das aplicações serem efectuadas com pulverizadores de médio ou baixo volume, as concentrações devem ser aumentadas por forma a manter constante a dose.

*** Esta concentração de 12,5-19 ml/hl corresponde a um volume de calda de 800 litros/ha. Para um volume de calda de 700 litros/ha, 14-21 ml/hl; para 600 litros/ha, 17-25 ml/hl; para 500 litros/ha, 20-30 ml/hl; para 400 litros/ha, 25-37,5 ml/hl e para 300 litros/ha corresponde 33-50 ml/hl. ** Em extensão de homologação.



Autorização de Venda nº 0071 concedida pela DGADR
Formulação: Suspensão concentrada (SC) com 480 g/l de tiaclopride.
Grupo Químico: Cloronicotinilo
Classificação Toxicológica, Ecotoxicológica e Ambiental: Xn, N
Embalagens: 30 ml e 200 ml.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
 Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.
 Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.

Bayer

Bayer CropScience (Portugal)
 Produtos para a Agricultura, Lda.
 Rua Quinta do Pinheiro, 5
 2794-003 CARNAXIDE
 Tel.: + 351 21 417 21 21 (Geral)
 Fax: + 351 21 417 20 65
www.cropsience.bayer.pt