



Alsystin[®]
Max

Aplicação contra
Bichado da fruta (*Cydia pomonella*)
Traça oriental (*Grapholita molesta*)
Anársia (*Anarsia lineatella*)

SIM

Tratamento desde o início do voo até o início da postura dos ovos.



NÃO

Tratamento à eclosão das larvas



Aplicação contra Zêuzera



Tratamento no pico do voo dos adultos, molhando bem as partes lenhosas.



Alsystin[®]
Max

- Eficácia comprovada após anos de experiência.
- A alternativa para a defesa contra os lepidópteros e psila.
- Novo registo sobre ameixa.

Para saber mais



www.bayercropscience.pt



Ficha técnica

Composição	Triflumurão 480 g/l
Formulação	Suspensão concentrada (SC)
Autorização de venda	00674 concedida pela DGAV
Embalagens	50 ml - 250 ml
Class. Tox., Ecotoxic. Ambiental:	GHS09, Atenção

BayProtege
Proteja-se ao proteger as culturas!

Utilize sempre equipamento de protecção adequado. Para saber como se proteger consulte **BayProtege** disponível em www.bayercropscience.pt

Utilize os produtos de forma segura. Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.

Bayer

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE

Tel.: + 351 21 417 21 21 (Geral)
Fax: + 351 21 417 20 65
www.cropscience.bayer.pt



Alsystin[®]
Max

O inseticida para o seu pomar

A alternativa eficaz para proteger a fruta contra bichado, traça oriental e outras pragas de lepidópteros.



www.cropscience.bayer.pt



Alsystin® Max mais uma opção para o fruticultor

Alsystin® Max

é um inseticida inibidor
da biossíntese da quitina.

Alsystin® Max

atua sobre as pragas nos seus
estádios mais vulneráveis:
durante a fase de desenvolvimento de
ovo a larva.

Alsystin® Max

contra bichado da fruta, traça oriental e
anársia actua como ovicida, enquanto
sobre outras espécies que se alimentam
à superfície actua também sobre os
estádios larvares mais tardios.

Modo de utilização

Cultura	Pragas	Concentração (Dose)	Intervalo de segurança
Macieira, pereira	Bichado da fruta (<i>Cydia pomonella</i>), Larvas mineiras (<i>Leucoptera malifoliella</i> , <i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>Phyllonorycter corylifoliella</i>), Traça oriental (<i>Grapholita molesta</i>), Zêuzera (<i>Zeuzera pyrina</i>)	25 ml/hl (0,250 - 0,375 L/ha)	28 dias
Pereira	Psila da pereira (<i>Cacopsylla pyri</i>)	25 ml/hl + 250 - 500 ml/hl de óleo mineral (0,250 - 0,375 L/ha)	28 dias
Ameixeira	Bichado das ameixas (<i>Cydia funebrana</i>) Larvas mineiras (<i>Phyllonorycter pomonella</i>) Zêuzera (<i>Zeuzera pyrina</i>)	25 ml/hl (0,250 - 0,375 L/ha)	14 dias
Pessegueiro, nectarina	Traça oriental (<i>Grapholita molesta</i>), Anársia (<i>Anarsia lineatella</i>), Zêuzera (<i>Zeuzera pyrina</i>), Larvas mineiras (<i>Phyllonorycter pomonella</i>)	25 ml/hl (0,250 - 0,375 L/ha)	14 dias

As pragas chave:

Bichado da fruta



Traça oriental



Anársia



Como utilizar Alsystin® Max:

- Tratamento no início do voo e antes da postura dos ovos.
- Efetuar a aplicação de modo a molhar completa e uniformemente toda a vegetação.

Utilizações e doses de aplicação

Não efectuar mais do que 2 tratamentos com Alsystin® Max por ciclo cultural, para o conjunto das pragas, em cada cultura. Intervalo mínimo entre as aplicações: 40 dias.