

# A peça que faltava no Puzzle




**Buctril®**   
**universal**

novo herbicida  
de pós-emergência para  
o controlo de infestantes  
dicotiledóneas em cereais



Bayer CropScience





# a peça que faltava no Puzzle

Herbicida misto composto por 2 substâncias activas distintas, **bromoxinil** e **2,4 - D**, uma combinação que lhe confere propriedades diferenciadoras. É absorvido por via foliar, actuando sobre as infestantes por contacto e de forma sistémica, com 2 diferentes modos de acção: inibe a fotossíntese e afecta o desenvolvimento celular. Estes atributos fazem do **Buctril Universal** um valioso instrumento para alternância de modos de acção, numa estratégia contra o desenvolvimento de infestantes resistentes, assim como um excelente complemento de espectro em infestantes dicotiledóneas, para misturas de tanque com outros herbicidas. Completa na perfeição o espectro de acção do **Atlantis** em infestantes dicotiledóneas.

## Condições de aplicação

Cultura	Dose	Modo de emprego	I.S.
Trigo Cevada Centeio	1 L/ha	Deve ser aplicado em pós-emergência, desde o início do afilhamento até ao aparecimento do 2º nó.	60 dias
Milho	0,8 L/ha	Deve ser aplicado em pós-emergência desde a 3ª até à 6ª folha.	90 dias
Sorgo			60 dias

## Principais Infestantes Susceptíveis

Aneixas (*Rapistrum rugosum*), bardana-menor (*Xanthium* spp.), bolsa-de-pastor (*Capsella bursa-pastoris*), camomila (*Matricaria chamomilla*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), cardo-leiteiro (*Silbum marianum*), catassol (*Chenopodium album*), cavalinha-dos-campos (*Equisetum arvense*), corriola (*Convolvulus arvensis*), erva-moira (*Solanum nigrum*), ervilhaca (*Vicia* spp.), fidalguinhos (*Centaurea cyanus*), moncos-de-peru (*Amaranthus retroflexus*), morugem-branca (*Stellaria media*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), ranúnculo-dos-campos (*Ranunculus arvensis*), raspa-saias (*Picris echioides*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), serralhas (*Sonchus* spp.), trepadeira-das-balças (*Calystegia sepium*), veronicas (*Veronica* spp.). Moderadamente susceptíveis: fumária (*Fumaria officinalis*), labagas (*Rumex* spp.).



Cardo-das-vinhas  
(*Cirsium arvense*)



Fidalguinhos  
(*Centaurea cyanus*)



Papoila-das-searas  
(*Papaver rhoeas*)



Bolsa-de-pastor  
(*Capsella bursa-pastoris*)



Morugem-branca  
(*Stellaria media*)



## Puzzle completo

sem infestantes

excelente produção

# Bayer

Bayer CropScience (Portugal)  
Produtos para a Agricultura, Lda.  
Rua Quinta do Pinheiro, 5  
2794-003 CARNAXIDE

Tel.: + 351 21 417 21 21 (Geral)  
Fax: + 351 21 417 20 65  
www.cropscience.bayer.pt



# Buctril<sup>®</sup> universal

- Novo herbicida de pós-emergência para cereais
- Com absorção foliar, acção sistémica e de contacto
- 2 diferentes modos de acção para uma estratégia anti-resistências
- Controla um largo espectro de infestantes dicotiledóneas (ervas de folha larga), incluindo algumas das mais problemáticas
- Excelente complemento para alternâncias e misturas de tanque

AV nº 0417 concedida pela DGA

### Composição:

EC com 280 g/L de bromoxinil  
+ 280 g/L de 2,4-D

### Classificação Toxicológica:

Nocivo (Xn)

Embalagens: 1 L e 5 L

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.

