

Proteja a produção

contra as doenças
da folha e da espiga
da cevada e do trigo



Folicur®

Fungicida com capacidade
sistémica e acção preventiva e
curativa no combate a diversas
doenças que atacam as folhas
e as espigas dos cereais





Folicur®

Fungicida contra doenças da folha e da espiga da cevada e do trigo

Propriedades

- Fungicida do grupo dos triazóis com capacidade sistémica e acção preventiva e curativa no combate a diversas doenças que atacam as folhas e as espigas da cevada e do trigo.
- Inibe a biossíntese do ergosterol, afectando a permeabilidade da membrana celular e, consequentemente, o desenvolvimento do micélio do fungo.
- Excelente persistência de acção.

Condições de Aplicação

Cultura	Problema	Dose	Modo de emprego
Cevada	Ferrugem castanha Helminthosporiose Oídio Rincosporiose	1 l/ha	O tratamento deve ser efectuado ao aparecimento das doenças de modo a manter protegidas as duas folhas superiores ("bandeiras") e as espigas.
Trigo	Ferrugem amarela Ferrugem castanha Oídio Septoriose Fusariose		Em tratamentos por via terrestre o débito aconselhado é de 400 l/ha e por meios aéreos de 25 l/ha em searas pouco densas, até 50 l/ha para searas pujantes.



Oídio



Septoriose



Helminthosporiose



Rincosporiose

Utilizações e Concentrações de Emprego

O **Folicur** permite combater:

Septoriose do trigo, Oídio do trigo e cevada, Helminthosporiose da cevada, Rincosporiose da cevada, Ferrugens castanha e amarela do trigo, Ferrugem castanha da cevada e Fusariose da espiga do trigo.

Doses de emprego:

Cevada e Trigo - Aplicar 1 litro de **Folicur** por hectare. Para combater focos localizados das doenças referidas pulverizar a parte doente da seara com uma calda de 2,5 decilitros de **Folicur** em 100 litros de água.

Épocas de aplicação:

Em anos muito favoráveis ao desenvolvimento das doenças efectuar dois tratamentos a intervalos de 2-3 semanas, entre o início do encanamento e o espigamento. No caso da fusariose das espigas do trigo o tratamento deverá ser efectuado no início da floração ou na ântese quando se prevejam condições favoráveis (quedas pluviométricas e temperaturas amenas). No caso de variedades mais sensíveis efectuar um segundo tratamento, na presença de sintomas, se as condições se mantiverem favoráveis.

Em certas condições este produto pode provocar necroses difusas nas folhas dos cereais tratados, sem efeitos negativos na produtividade.

Não se deve aplicar o **Folicur** nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.

Proteja a produção



Folicur
Microemulsão com 250 g/l de tebuconazol

Classificação Toxicológica: Nocivo

Embalagens: 5 l e 20 l



Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide
Tel: (+351) 214 165 031
Fax: (+351) 214 172 065
www.cropscience.bayer.pt

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.
Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.