FICHA TÉCNICA

Confidor® O-TEQ

Insecticida sistémico para controlo de afídeos e moscas-brancas em hortícolas em estufa

Formulação/Composição
Dispersão em óleo (OD) contendo 200 g/L ou 19,4% (p/p) de imidaclopride

Confidor O-TEQ é um insecticida sistémico à base de imidaclopride que actua por contacto e ingestão pertencente ao grupo dos neonicotinóides, com ação no sistema nervoso dos insectos como modeladores competitivos dos receptores nicotínicos da acetilcolina (nAChR), IRAC MoA subgrupo 4A.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Os produtos com base em imidaclopride podem apenas ser utilizados em estufas com estrutura permanente.
Aplicação no sistema de rega gota-a-gota na **dose de 0,75 L/ha**. Máximo de 1 aplicação com imidaclopride, por ciclo cultural e para o conjunto das pragas, nas seguintes culturas:

Pimenteiro, Tomateiro e Beringela contra **Afídeos** *(Myzus persicae* e *Macrosiphum euphorbiae)* e **Moscas-brancas** *(Bemisia tabaci* e*Trialeurodes vaporariorum):*
Aplicar ao início do ataque da praga, desde o início da primeira folha verdadeira até ao início da maturação do fruto. Volume de calda no sistema de rega gota-a-gota: 2500 L/ha em pimenteiro, 875 L/ha em tomateiro e 1250 L/ha em beringela.
Intervalo de Segurança: 3 dias.

Pepino, Courgette (aboborinha), Meloeiro e **Melancia** contra **Afídeo-do-algodoeiro** *(Aphis gossypii)* e **Moscas brancas** *(Bemisia tabaci* e *Trialeurodes vaporariorum):*
Aplicar ao início do ataque da praga no princípio do desenvolvimento da cultura até às 5 folhas. Volume de calda no sistema de rega gota-a-gota: 1000 a 5000 L/ha nestas culturas.
Intervalo de Segurança: não definido devido à época de aplicação.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outro que contenha neonicotinóides e ou o mesmo modo de ação, mais de 1 vez, por ciclo cultural e para o conjunto das pragas.

MODO DE APLICAÇÃO

Rega-gota-a-gota: O produto deve ser adicionado no sistema de irrigação através de um doseador. No caso de não ser utilizado um doseador, a preparação da calda deve ser feita num depósito do sistema de rega ou, preferencialmente, num depósito específico para produtos fitofarmacêuticos. No depósito onde é efetuada a mistura do produto com água, deve existir uma agitação contínua para originar uma calda homogénea.

Deve ser efetuada a calibragem apropriada do sistema de rega a fim de permitir uma distribuição uniforme do produto na área desejada, respeitando a dose aprovada.

No final do ciclo de irrigação deve ser realizada a limpeza do sistema através da circulação de água. O sistema de irrigação não deve estar ligado a sistemas de irrigação públicos e deve ser equipado com uma válvula que impeça o refluxo.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Atenção

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Evitar respirar a nuvem de pulverização.
Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Recolher o produto derramado.
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Armazenamento. Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
Nos tratamentos em estufa, para proteção das abelhas e outros insetos polinizadores, não aplicar este produto antes e durante a floração das culturas, quando se pretende usar polinizadores.
Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado antes de nelas voltar a entrar.
Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
O aplicador deverá usar: luvas durante a preparação da calda; luvas e vestuário de proteção durante a aplicação do produto.
Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.
Telef.: 808 250 143

FT: 20119

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.