



FICHA TÉCNICA

Movento[®] O-TEQ

Insecticida sistémico de contacto e ingestão indicado no combate às seguintes pragas:

Videira: cochonilhas

Citrinos: cochonilhas e mosca-branca dos citrinos.

Tomateiro, Pimenteiro e Beringela: moscas-brancas e afídeos.

Formulação/Composição

Dispersão em óleo (OD) contendo 150 g/L ou 15,3% (p/p) de espirotetramato

O **Movento O-TEQ** é um insecticida à base de espirotetramato, substância activa da nova família dos ácidos tetrónicos. O espirotetramato tem um modo de acção novo: interfere na biossíntese dos lípidos. É um produto com sistemias ascendente e descendente e que actua por contacto e ingestão.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira: cochonilhas (*Parthenolecanium corni* e *Planococcus ficus*) – aplicar ao aparecimento das formas móveis numa dose de 0,5 L de **Movento O-TEQ** por hectare para um volume da calda de 1000 L/ha. Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, quando existam. Se necessário, repetir o tratamento 21 dias depois, no máximo de 2 aplicações.

Citrinos: cochonilhas (*Aonidiella aurantii*, *Aspidiotus nerii*, *Parlatoria pergandii*, *Coccus hesperidum*) – aplicar ao aparecimento das formas móveis numa dose de 0,3 L a 0,5 L de **Movento O-TEQ** por hectare com um volume máximo de calda de 1500 L/ha. Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, quando existam. Se necessário, repetir o tratamento 21 dias depois, no máximo de 2 aplicações.

Citrinos: mosca-branca dos citrinos (*Aleurothrixus floccosus*) – aplicar na dose de 0,3 L de **Movento O-TEQ** por hectare com um volume máximo de calda de 1500 L/ha. Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Se necessário, repetir o tratamento 21 dias depois, no máximo de 2 aplicações.

Em citrinos, para o conjunto das pragas, realizar um máximo de 2 aplicações com o **Movento O-TEQ** por ciclo cultural.

Tomateiro, pimenteiro e beringela: moscas-brancas (*Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*) e **afideos** (*Myzus persicae*) – aplicar na concentração de 40-60 ml de **Movento O-TEQ**/hl com um volume da calda de 1000 L/ha (dose de 0,4 L a 0,6 L de **Movento O-TEQ** por hectare). Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Se necessário repetir até ao máximo de 3 tratamentos com intervalos de 7 dias em cada cultura e no conjunto das pragas.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Em certas circunstâncias como por exemplo, baixas temperaturas ou stress hídrico poderão verificar-se sintomas de fitotoxicidade em algumas variedades de fruteiras.

De modo a evitar o aparecimento de resistências a este insecticida, o **Movento O-TEQ** deve ser usado em programas de pulverização alternando a sua aplicação com insecticidas de outros grupos químicos com diferente modo de acção.

Não se recomenda a mistura de **Movento O-TEQ** com outros produtos.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Deitar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.



MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Suspeito de afetar a fertilidade. Suspeito de afetar o nascituro.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Ficha de segurança fornecida a pedido.



Atenção

Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Recolher o produto derramado.
Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar equipamento de protecção individual exigido.
Pedir instruções específicas antes da utilização.
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.
Armazenar em local fechado à chave.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizamento, ou usar luvas e vestuário de protecção adequado.

Intervalo de Segurança: 3 dias em beringela, pimenteiro e tomateiro; 14 dias em citrinos e videira.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos.
Telef.: 808 250 143.

FT: 21214

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.