



Ficha técnica

Garbol

Acaricida/Inseticida para controlo de Ácaros (pomóideas e prunóideas), Cochonilhas (citrinos) e Formas hibernantes de ácaros e insetos (pomóideas, prunóideas e videira)

Formulação/Composição

Concentrado para emulsão (EC) com 790 g/L de óleo parafínico

Propriedades

- **Garbol** é um acaricida e inseticida de óleo parafínico.
- É um hidrocarboneto que atua por contacto, formando uma película sobre o inimigo e causando-lhe morte por asfixia.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Ameixeira	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	30 L/ha	Tratar na presença da praga, entre o final da floração e o amadurecimento dos frutos. Repetir após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Ameixeira	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	37.5 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Cerejeira	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	30 L/ha	Tratar na presença da praga, entre o final da floração e o amadurecimento dos frutos. Repetir após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Cerejeira	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	37.5 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Citrinos	Garbol	Cochonilhas	1-2 L/hL	40 L/ha	Tratar ao máximo de eclosão das ninfas. Respeitar um intervalo de 15 dias entre aplicações (máximo de 2 aplicações).
Damasqueiro	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	30 L/ha	Tratar na presença da praga, entre o final da floração e o amadurecimento dos frutos. Repetir após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Damasqueiro	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	37.5 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Framboesa	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	20 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/ usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Ginjeira	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	30 L/ha	Tratar na presença da praga, entre o final da floração e o amadurecimento dos frutos. Repetir após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Ginjeira	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	37.5 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Macieira	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	30 L/ha	Tratar na presença da praga, entre o final da floração e o amadurecimento dos frutos. Repetir após 15 dias (máximo de 2 aplicações).

Macieira	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	37.5 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Mirtilo	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	20 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/ usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Pereira	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	30 L/ha	Tratar na presença da praga, entre o final da floração e o amadurecimento dos frutos. Repetir após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Pereira	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	37.5 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Pessegueiro	Garbol	Ácaros	1-2 L/hL	30 L/ha	Tratar na presença da praga, entre o final da floração e o amadurecimento dos frutos. Repetir após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Pessegueiro	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	37.5 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Videira (uva de mesa)	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	15 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).
Videira (uva para vinificação)	Garbol	Formas hibernantes de ácaros e insetos	1.75-2.5 L/hL	15 L/ha	Aplicar entre o repouso vegetativo e o aparecimento da 1.ª folha. Respeitar após 15 dias (máximo de 2 aplicações).

Precauções Biológicas

- Não misturar **Garbol** com os seguintes produtos: captana, ditianão, enxofre, folpete, tirame e zirame. Respeitar um período de 15 dias entre a aplicação de **Garbol** e a aplicação dos produtos mencionados.
- Podem existir alguns sintomas de fitotoxicidade nas variedades de macieira Golden Delicious, durante as aplicações efetuadas no Verão.
- Em citrinos, não aplicar o produto após a floração, sem que os frutos atinjam previamente o tamanho de uma noz.
- Não utilizar o produto quando se preveja a possibilidade de geada no dia do tratamento.
- Evitar o tratamento com temperaturas inferiores a 5°C e temperaturas superiores a 30°C.
- Não tratar as culturas que estejam a sofrer de seca (stress hídrico).
- Regar os citrinos antes do tratamento.
- **Garbol** está autorizado em **modo de produção biológico**.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



Mortal por ingestão/penetração nas vias respiratórias.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

não tem

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.