



Ficha técnica

Movento Gold SC

Inseticida sistémico que atua sobre um largo grupo de pragas (afídeos, cochonilhas, moscas brancas, psilóides e tripses) em diversas culturas.

Formulação/Composição

Suspensão concentrada (SC) com 100 g/L de espirotetramato

Propriedades

■ **Movento Gold** é um inseticida que contém espirotetramato, substância ativa pertencente à nova família química dos derivados de ácido tetrónico.

■ **Movento Gold** apresenta elevada sistemica (ascendente e descendente), atuando essencialmente por ingestão.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Abacateiro	Movento Gold SC	Percevejos	120-150 mL/hL	1800-3000 mL/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Agrião	Movento Gold SC	Afídeos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Aipo-rábano	Movento Gold SC	Afídeos		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Aipo-rábano	Movento Gold SC	Psilídeo		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Alface	Movento Gold SC	Afídeos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Aplicar após as 5 folhas separadas, até que a planta atinja o seu tamanho médio. (máximo de 2 aplicações , com intervalo mínimo de 14 dias)
Alface de cordeiro	Movento Gold SC	Afídeos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Ameixeira	Movento Gold SC	Afídeos	75-100 mL/hL	1 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Ameixeira	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.

Ameixeira	Movento Gold SC	Tripes	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Amendoeira	Movento Gold SC	Afideos	75-130 mL/hL	0.4-1.3 L/ha	Aplicar após o final da floração (BBCH 70-87). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 14 dias
Amendoeira	Movento Gold SC	Afideos	75-130 mL/hL	0.4-1.3 L/ha	Aplicar após o final da floração (BBCH 70-87). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 14 dias
Amendoeira	Movento Gold SC	Cochonilhas	75-130 mL/hL	0.4-1.3 L/ha	Aplicar após o final da floração (BBCH 70-87). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 14 dias
Angélica-da-boémia	Movento Gold SC	Afideos		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Avelã	Movento Gold SC	Afideos	75-130 mL/hL	0.4-1.3 L/ha	Aplicar após o final da floração (BBCH 70-87). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 14 dias
Avelã	Movento Gold SC	Cochonilhas	75-130 mL/hL	0.4-1.3 L/ha	Aplicar após o final da floração (BBCH 70-87). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 14 dias
Bananeira	Movento Gold SC	Cochonilhas	45-75 mL/hL	0.45-0.75 L/ha	Tratar durante o período vegetativo e tratar após a queda dos pistilos. Repetir após 30 dias. Não pulverizar após a formação do cacho.
Bananeira	Movento Gold SC	Mosca branca	45-75 mL/hL	0.45-0.75 L/ha	Tratar durante o período vegetativo e tratar após a queda dos pistilos. Repetir após 30 dias. Não pulverizar após a formação do cacho.
Beterraba	Movento Gold SC	Afideos		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Brássicas de 6-8 folhas	Movento Gold SC	Afideos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Cebola	Movento Gold SC	Tripes	75-250 mL/hL	0.75 L/ha	Aplicar após as 5 folhas separadas. (máximo de 4 aplicações , com intervalo mínimo de 7 dias)
Cenoura	Movento Gold SC	Afideos	56-250 mL/hL	750 mL/ha	Tratar a partir do aparecimento das folhas verdadeiras. Repetir após 14 dias.
Cenoura	Movento Gold SC	Psilídeo	56-250 mL/hL	750 mL/ha	Tratar a partir do aparecimento das folhas verdadeiras. Repetir após 14 dias.

Cercifi	Movento Gold SC	Afideos	0.45-0.75 L/ha		Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Cerefólio-re-raiz	Movento Gold SC	Afideos	0.45-0.75 L/ha		Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Cerefólio-re-raiz	Movento Gold SC	Psilídeo	0.45-0.75 L/ha		Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Cerejeira	Movento Gold SC	Afideos	75-100 mL/hL	1 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Cerejeira	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Cerejeira	Movento Gold SC	Tripes	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Chicória-de-café	Movento Gold SC	Afideos	0.45-0.75 L/ha		Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Citrinos	Movento Gold SC	Afideos	45-60 mL/hL	0.6 L/ha	Tratar após o vingamento, até que os frutos atinjam 90% do seu tamanho final. O intervalo entre tratamentos deve ser de 21 dias.
Citrinos	Movento Gold SC	Cochonilhas	45-75 mL/hL	0.75 L/ha	Tratar após o vingamento, até que os frutos atinjam 90% do seu tamanho final. O intervalo entre tratamentos deve ser de 21 dias.
Citrinos	Movento Gold SC	Mosca branca	45-75 mL/hL	0.75 L/ha	Tratar após o vingamento, até que os frutos atinjam 90% do seu tamanho final. O intervalo entre tratamentos deve ser de 21 dias.
Citrinos	Movento Gold SC	Tripes	60-75 mL/hL	0.75 L/ha	Tratar após o vingamento, até que os frutos atinjam 90% do seu tamanho final. O intervalo entre tratamentos deve ser de 21 dias.
Couves	Movento Gold SC	Mosca branca	75-150 mL/hL	0.45-0.75 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Couves	Movento Gold SC	Tripes	75-150 mL/hL	0.75 L/ha	Aplicar desde as 5 folhas separadas, até que o centro da couve tenha alcançado o seu tamanho médio. (máximo de 2 aplicações, com intervalo mínimo de 14 dias)
Damasqueiro	Movento Gold SC	Afideos	75-100 mL/hL	1 L/ha	Tratar entre a queda das flores e o início da maturação. Repetir após 14 dias.
Damasqueiro	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a queda das flores e o início da maturação. Repetir após 14 dias

Damasqueiro	Movento Gold SC	Tripes	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a queda das flores e o início da maturação. Repetir após 14 dias.
Diospireiro	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	1500 mL/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Escarola	Movento Gold SC	Afideos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Escorcioneira	Movento Gold SC	Afideos		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Espinafre	Movento Gold SC	Afideos	75-250 mL/hL	75 mL/ha	Aplicar após as 2 folhas separadas. (máximo de 2 aplicações , com intervalo mínimo de 14 dias)
Macieira	Movento Gold SC	Afideos	75-120 mL/hL	1.2 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Macieira	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Macieira	Movento Gold SC	Pulgão-lanígeno	75-150 mL/hL	1.9 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Mirtilo	Movento Gold SC	Afideos	75 mL/hL	0.75 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Mirtilo	Movento Gold SC	Cochonilhas	75-95 mL/hL	0.95 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Mirtilo	Movento Gold SC	Tripes	75-95 mL/hL	0.95 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Morango	Movento Gold SC	Ácaros	100-334 mL/hL	1 L/ha	Aplicar após as 3 folhas separadas, até 14 dias antes da floração. (máximo de 2 aplicações , com intervalo mínimo de 14 dias)
Morango	Movento Gold SC	Afideos	50-100 mL/hL	750 mL/ha	Aplicar após as 3 folhas separadas, até 14 dias antes da floração. (máximo de 2 aplicações , com intervalo mínimo de 14 dias)
Morango	Movento Gold SC	Mosca branca	75-250 mL/hL	75 mL/ha	Aplicar após as 3 folhas separadas, até 14 dias antes da floração. (máximo de 2 aplicações , com intervalo mínimo de 14 dias)
Mostardas	Movento Gold SC	Afideos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Nabo	Movento Gold SC	Afideos		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Nectarina	Movento Gold SC	Afideos	75-100 mL/hL	1500 mL/ha	Tratar após a floração até ao início da maturação. Repetir após 14 dias.

Nectarina	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	2250 mL/ha	Tratar após a floração até ao início da maturação. Repetir após 14 dias.
Nectarina	Movento Gold SC	Tripes	120-150 mL/hL	2250 mL/ha	Tratar após a floração até ao início da maturação. Repetir após 14 dias.
Nogueira	Movento Gold SC	Afideos	75-130 mL/hL	0.4-1.3 L/ha	Aplicar após o final da floração (BBCH 70-87). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 14 dias
Nogueira	Movento Gold SC	Cochonilhas	75-130 mL/hL	0.4-1.3 L/ha	Aplicar após o final da floração (BBCH 70-87). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 500 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 14 dias
Pastinaca	Movento Gold SC	Afideos		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Pastinaca	Movento Gold SC	Psilídeo		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias
Pereira	Movento Gold SC	Afideos	75-120 mL/hL	1.2 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Pereira	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Pereira	Movento Gold SC	Psila	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a floração e o início da maturação. O intervalo entre tratamentos deve ser de 14 dias.
Pessegueiro	Movento Gold SC	Afideos	75-100 mL/hL	1 L/ha	Tratar entre a queda das flores e o início da maturação. Repetir após 14 dias.
Pessegueiro	Movento Gold SC	Cochonilhas	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a queda das flores e o início da maturação. Repetir após 14 dias.
Pessegueiro	Movento Gold SC	Tripes	120-150 mL/hL	1.5 L/ha	Tratar entre a queda das flores e o início da maturação. Repetir após 14 dias.
Plantas ornamentais para produção de Folha	Movento Gold SC	Mosca branca	45-90 mL/hL	0.45-0.9 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/ usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Plantas ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e em vaso)	Movento Gold SC	Mosca branca	45-90 mL/hL	0.45-0.9 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/ usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Rabanete	Movento Gold SC	Afideos		0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias

Rábano-de-cavalo	Movento Gold SC	Afídeos	0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias	
Romã	Movento Gold SC	Afídeos	75-150 mL/hL	1500 mL/ha	Realizar tratamentos após a floração, sem flores presentes. Repetir após 14 dias.
Romã	Movento Gold SC	Cochonilhas	75-150 mL/hL	1500 mL/ha	Realizar tratamentos após a floração, sem flores presentes. Repetir após 14 dias.
Rúcula	Movento Gold SC	Afídeos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Rúcula selvagem	Movento Gold SC	Afídeos	60-200 mL/hL	0.45-0.6 L/ha	Tratar após as 5 folhas separadas, até a planta atingir o tamanho médio. Repetir após 14 dias.
Salsa-de-raiz-grossa	Movento Gold SC	Psilídeo	0.45-0.75 L/ha	Realizar os tratamentos entre o aparecimento das 2 folhas verdadeiras e o fim do crescimento radicular (BBCH 12-49). Realizar no máximo 4 aplicações com intervalo mínimo de 14 dias, entre aplicações. Volume de calda: 200 a 800 L/ha. Intervalo de segurança pré-colheita: 21 dias	
Videira (uva de mesa)	Movento Gold SC	Cochonilhas	75-95 mL/hL	0.95 L/ha	Aplicar entre o vingamento dos bagos e o fecho dos cachos. Repetir após 14 dias.
Videira (uva para vinificação)	Movento Gold SC	Cochonilhas	75-95 mL/hL	0.95 L/ha	Aplicar entre o vingamento dos bagos e o fecho dos cachos. Repetir após 14 dias.

Precauções Biológicas

■ O n.º máximo de aplicações em todas as culturas é de 2 por ciclo cultural, com exceção da cenoura (4 aplicações por ciclo cultural).

■ Devido ao seu modo de ação diferenciado, o espirotetramato não apresenta resistência cruzada com outros inseticidas (ex: carbamatos, organofosforados, neonicotinóides e piretróides), estando assim indicado contra as pragas que sejam resistentes a este tipo de inseticidas e a sua inclusão recomendada em programas de prevenção de resistência.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



Provoca uma reação alérgica cutânea.
Suspeito de afetar a fertilidade/o nascituro.

Tóxico para organismos aquáticos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

- 3 dias em couves
- 7 dias em alface, alface de cordeiro, agrião, brássicas de 6-8 folhas, escarola, mostarda, rúcula e rúcula selvagem
- 14 dias em bananeira, diospireiro, citrinos, romãzeiras e videira
- 21 dias em cenouras, nectarina, pomóideas e prunóideas

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.