



Aliette Flash

Fungicida sistémico para o combate de Fogo bacteriano (pomóideas), Gomose (citrinos), Míldio (citrinos, lúpulo, melão e morango), *Phytophthora* (azinheira e sobreiro), Podridão (pomóideas) e Tinta (castanheiro)

Formulação/Composição

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 74% de fosetil-Al

Propriedades

- **Aliette Flash** é um fungicida sistémico (mobilidade ascendente/descendente), com atividade preventiva e curativa.
- Ativa as defesas das plantas, interferindo no metabolismo fosfatado.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Abacateiro	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	200 mL/hL	2 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Acelga	Aliette Flash	Murchidão das plantas	200-250 mL/hL	2-2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Ananás	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Azinheira	Aliette Flash	Declínio	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Aplicar ao aparecimento dos 1.ºs sintomas.
Castanheiro	Aliette Flash	Tinta	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Tratar as plantas em 4-6 folhas (em viveiro) ou em pré-floração (cultura estabelecida).
Citrinos	Aliette Flash	Gomose	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Aplicar após os 1.ºs sintomas, durante a fase de crescimento (máximo de 3 aplicações).
Citrinos	Aliette Flash	Míldio	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Aplicar entre Novembro-Fevereiro, sob tempo frio e chuvoso (máximo de 3 aplicações).
Couves	Aliette Flash	Míldio	200-250 mL/hL	2-2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Couves	Aliette Flash	Murchidão das plantas	200-250 mL/hL	2-2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Eucalipto	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	200-250 g/hL	2.5 Kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.

Kiwi	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	250 g/hL	2.5-5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Lúpulo	Aliette Flash	Mildio	250 mL/hL	1.5-4 kg/ha	Aplicar aos 1.ºs sintomas e repetir após 14 dias (máximo de 2 aplicações).
Macieira	Aliette Flash	Fogo bacteriano	375 mL/hL	3.75 kg/ha	Tratar após o início da floração. Repetir após 3-4 dias (máximo de 3 aplicações).
Macieira	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	250 mL/hL	0.75-2.5 kg/ha	Aplicar mensalmente, desde que a folhagem seja abundante (máximo de 3 aplicações).
Melão	Aliette Flash	Mildio	950-1850 mL/hL	3.75 kg/ha	Aplicar preventivamente a partir da floração. Repetir após 10 dias (até 2 aplicações).
Morango	Aliette Flash	Mildio	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Mergulhar as raízes na calda. Pulverizar, após 2 meses de transplantação.
Pereira	Aliette Flash	Fogo bacteriano	375 mL/hL	3.75 kg/ha	Tratar após o início da floração. Repetir após 3-4 dias (máximo de 3 aplicações).
Pereira	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	250 mL/hL	0.75-2.5 kg/ha	Aplicar mensalmente, desde que a folhagem seja abundante (máximo de 3 aplicações).
Plantas florestais	Aliette Flash	Murchidão das plantas	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Plantas florestais	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Plantas ornamentais	Aliette Flash	Murchidão das plantas	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Plantas ornamentais	Aliette Flash	Podridão de colo/raízes	250 mL/hL	2.5 kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Relvados	Aliette Flash	Murchidão das plantas	1200-2400 mL/hL	12-24 Kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Rúcula	Aliette Flash	Mildio	200-250 mL/hL	2-2.5 Kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Rúcula selvagem	Aliette Flash	Mildio	200-250 mL/hL	2-2.5 Kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Salsa	Aliette Flash	Mildio	100 mL/hL	1 Kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Sobreiro	Aliette Flash	Declínio	250 mL/hL	2.5 Kg/ha	Aplicar ao aparecimento dos 1.ºs sintomas.

Precauções Biológicas

- Recomenda-se efetuar previamente um teste de solubilidade antes da mistura com adubos foliares azotados.
- Consultar a indústria antes de usar o produto em fruta destinada a transformação industrial.
- Não se recomenda a mistura de **Aliette Flash** com produtos cúpricos.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



Provoca irritação ocular grave.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

- 3 dias em melão
- 14 dias em lúpulo e morango
- 15 dias em citrinos
- 28 dias em macieira e pereira

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.