



CupraVit

Fungicida indicado para Bananeira (cercosporiose), Citrinos (alternariose, míldio e pinta negra), Oliveira (gafa e olho de pavão), Pomóideas (cancro fúngico, moniliose e pedrado), Prunóideas (cancro bacteriano, crivado, lepra e moniliose) e Videira (míldio).

Formulação/Composição

Pó molhável (WP) com 50% de cobre, sob a forma de oxiclreto de cobre

Propriedades

- O **CupraVit** é um fungicida de superfície com ação preventiva, inibidor da germinação de esporos dos fungos.
- O **CupraVit** é particularmente recomendado para tratamentos invernais ou tratamentos ao inchamento dos gomos.
- Tem excelente persistência de ação.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Ameixeira	CupraVit	Crivado	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumecimento dos gomos.
Ameixeira	CupraVit	Lepra	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumecimento dos gomos.
Ameixeira	CupraVit	Moniliose	0.4 Kg/hL	4 Kg/ha	Aplicar ao entumecimento dos gomos.
Amendoeira	CupraVit	Cancro bacteriano	0.6 Kg/hL	6 Kg/ha	Fazer 3 tratamentos: início, meio e fim da queda das folhas. Os tratamentos seguintes não podem ser realizados com este produto.
Amendoeira	CupraVit	Crivado	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumecimento dos gomos.
Amendoeira	CupraVit	Lepra	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumecimento dos gomos.
Amendoeira	CupraVit	Moniliose	0.4 Kg/hL	4 Kg/ha	Aplicar ao entumecimento dos gomos.
Bananeira	CupraVit	Cercosporiose	0.5 Kg/hL	5 Kg/ha	Aplicar na época de maior humidade e expansão vegetativa (Março-Junho). Repetir após 14-21 dias.
Cerejeira	CupraVit	Cancro bacteriano	0.6 Kg/hL	6 Kg/ha	Fazer 3 tratamentos: início, meio e fim da queda das folhas. Os tratamentos seguintes não podem ser realizados com este produto.
Cerejeira	CupraVit	Crivado	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumecimento dos gomos.
Cerejeira	CupraVit	Lepra	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumecimento dos gomos.
Cerejeira	CupraVit	Moniliose	0.4 Kg/hL	4 Kg/ha	Aplicar ao entumecimento dos gomos.
Citrinos	CupraVit	Alternariose	0.3- 0.6 Kg/hL	3-6 Kg/ha	Aplicar durante o Outono, quando se verificar uma quebra de temperatura e surgirem as 1.ªs chuvas fortes. Repetir após 21-28 dias.
Citrinos	CupraVit	Míldio	0.3- 0.6 Kg/hL	3-6 Kg/ha	Aplicar durante o Outono, quando se verificar uma quebra de temperatura e surgirem as 1.ªs chuvas fortes. Repetir após 21-28 dias.

Citrinos	CupraVit	Pinta negra	0.3-0.6 Kg/hL	3-6 Kg/ha	Aplicar durante o Outono, quando se verificar uma quebra de temperatura e surgirem as 1.ªs chuvas fortes. Repetir após 21-28 dias.
Damasqueiro	CupraVit	Crivado	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumescimento dos gomos.
Damasqueiro	CupraVit	Moniliose	0.4 Kg/hL	4 Kg/ha	Aplicar ao entumescimento dos gomos.
Ginjeira	CupraVit	Cancro bacteriano	0.6 Kg/hL	6 Kg/ha	Fazer 3 tratamentos: início, meio e fim da queda das folhas. Os tratamentos seguintes não podem ser realizados com este produto.
Ginjeira	CupraVit	Moniliose	0.4 Kg/hL	4 Kg/ha	Aplicar ao entumescimento dos gomos.
Kiwi	CupraVit	Bacteriose	0.2-0.25 Kg/hL	2-2.5 Kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/ usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Kiwi	CupraVit	Manchas foliares	0.15-0.2 Kg/hL	1.5-2 Kg/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/ usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Macieira	CupraVit	Cancro fúngico	0.5-1 Kg/hL	5-10 Kg/ha	Aplicar no início, meio e fim da queda das folhas.
Macieira	CupraVit	Moniliose	0.4-0.6 Kg/hL	4-6 Kg/ha	Utilizar as doses de 6 Kg/ha no repouso vegetativo e de 4 Kg/ha na ponta verde. Realizar os tratamentos seguintes com outro produto .
Macieira	CupraVit	Pedrado	0.4-0.6 Kg/hL	0.4-0.6 Kg/ha	Utilizar as doses de 6 Kg/ha no repouso vegetativo e de 4 Kg/ha na ponta verde. Realizar os tratamentos seguintes com outro produto .
Nespereira	CupraVit	Pedrado	0.4-0.6 Kg/hL	4-6 Kg/ha	Tratar um pouco antes da floração. Repetir à queda das pétalas e após 21-28 dias, até à mudança de cor dos frutos (sempre que a doença o justifique).
Oliveira	CupraVit	Gafa	0.4-0.5 Kg/hL	4-5 Kg/ha	Efetuar o 1.º tratamento, antes das 1.ªs chuvas outonais. Repetir o tratamento após 21 dias.
Oliveira	CupraVit	Olho de pavão	0.4-0.5 Kg/hL	4-5 Kg/ha	Os tratamentos outonais contra a gafa protegem contra esta doença. Em Primaveras chuvosas, repetir o tratamento no início do ciclo vegetativo.
Pereira	CupraVit	Cancro fúngico	0.5-1 Kg/hL	5-10 Kg/ha	Aplicar no início, meio e fim da queda das folhas.
Pereira	CupraVit	Moniliose	0.4-0.6 Kg/hL	4-6 Kg/ha	Utilizar as doses de 6 Kg/ha no repouso vegetativo e de 4 Kg/ha na ponta verde. Realizar os tratamentos seguintes com outro produto .
Pereira	CupraVit	Pedrado	0.4-0.6 Kg/hL	4-6 Kg/ha	Utilizar as doses de 6 Kg/ha no repouso vegetativo e de 4 Kg/ha na ponta verde. Realizar os tratamentos seguintes com outro produto .
Pessegueiro	CupraVit	Crivado	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumescimento dos gomos.
Pessegueiro	CupraVit	Lepra	0.4-1 Kg/hL	4-10 Kg/ha	Usar as doses de 10 Kg/ha à queda das folhas e de 4 Kg/ha ao entumescimento dos gomos.
Pessegueiro	CupraVit	Moniliose	0.4 Kg/hL	4 Kg/ha	Aplicar ao entumescimento dos gomos.
Videira (uva de mesa)	CupraVit	Míldio	0.3-0.6 Kg/hL	3-6 Kg/ha	Só deve ser aplicado nos 2 últimos tratamentos.
Videira (uva para vinificação)	CupraVit	Míldio	0.3-0.6 Kg/hL	3-6 Kg/ha	Só deve ser aplicado nos 2 últimos tratamentos.

- Em prunóideas, utilizar apenas o **Cupravit** até ao abrolhamento dos gomos ou durante a queda das folhas (devido ao risco de fitotoxicidade).
- Deve-se impedir a entrada de animais nas áreas tratadas durante 3 semanas.
- Na variedade de macieira "Golden Delicious", apenas efetuar aplicações durante o repouso vegetativo.
- **Cupravit** não deve ser aplicado com tempo frio e chuvoso, devido ao risco de fitotoxicidade.
- **Cupravit** está autorizado em modo de produção biológico.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



**Nocivo por inalação/ingestão.
Muito tóxico para organismos aquáticos.**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

7 dias

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.