



Folicur

Fungicida sistémico, preventivo e curativo para combater doenças em Cevada (ferrugens, helmintosporiose, oídio e rincosporiose), Oliveira (olho de pavão) e Trigo (ferrugens, fusarioses, oídio e septoriose)

Formulação/Composição

Microemulsão (ME) com 250 g/L de tebuconazol

Propriedades

■ **Folicur** é um fungicida do grupo dos triazóis (inibidor da biossíntese dos esteróis na desmetilação (DMI)), com atividade preventiva e curativa.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Cevada	Folicur	Ferrugens	0.25 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas, de forma a proteger as 2 folhas superiores ("folhas bandeira").
Cevada	Folicur	Helmintosporiose	0.25 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas, de forma a proteger as 2 folhas superiores ("folhas bandeira").
Cevada	Folicur	Oídio	0.25 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas, de forma a proteger as 2 folhas superiores ("folhas bandeira").
Cevada	Folicur	Rincosporiose	0.25 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas, de forma a proteger as 2 folhas superiores ("folhas bandeira").
Espargo	Folicur	Fusarioses	0.25 L/hL	1 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Oliveira	Folicur	Olho de pavão	0.06 L/hL	0.6 L/ha	Aplicar durante o início da Primavera, em pré-floração até ao início da abertura dos gomos florais.
Plantas ornamentais	Folicur	Antracnose	0.25 L/hL	1 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Plantas ornamentais	Folicur	Fusarioses	0.25 L/hL	1 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Trigos	Folicur	Ferrugens	0.25 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas, de forma a proteger as 2 folhas superiores ("folhas bandeira").
Trigos	Folicur	Fusarioses	0.25 L/hL	1 L/ha	O tratamento deverá ser efetuado na ântese/início da floração, quando se prevejam condições favoráveis (quedas pluviométricas e temperaturas amenas).
Trigos	Folicur	Oídio	0.25 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas, de forma a proteger as 2 folhas superiores ("folhas bandeira").
Trigos	Folicur	Septoriose	0.25 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas, de forma a proteger as 2 folhas superiores ("folhas bandeira").

Precauções Biológicas

- realizar o máximo de 1 tratamento por ano com este produto.
- Em certas condições, podem surgir necroses difusas nas folhas dos cereais tratados, sem efeitos na sua produtividade.
- Não se deve aplicar o **Folicur** em locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.
- Não se deve efetuar mais de 2 tratamentos com produtos do mesmo modo de ação (DMI) em oliveira e 1 tratamento em cereais.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



**Nocivo por inalação ou ingestão.
Provoca lesões oculares graves.**

Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Suspeito de afetar o nascituro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

35 dias em cevada e trigo

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.