



Luna Sensation

Fungicida indicado para **Alface (esclerotinia), Morango (oidio e podridão cinzenta), Pimento, Tomate e Beringela (podridão cinzenta)**

Formulação/Composição

Suspensão concentrada (SC) com 250 g/L de fluopirame e 250 g/L de trifloxistrobina

Propriedades

- O **Luna Sensation** é um fungicida com ação preventiva e curativa, à base de fluopirame e trifloxistrobina.
- O fluopirame é uma substância ativa que atua como inibidora da respiração dos fungos (complexo II) e da enzima succinato desidrogenase (SDHI).
- A trifloxistrobina é uma substância ativa (QoI) que também atua como inibidora da respiração dos fungos (complexo III).

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Dose	Modo de Emprego
Agrião	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da parte comestível.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Agrião	Luna Sensation	Rizoctónia	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da parte comestível.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Agrião	Luna Sensation	Scierotinia	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da parte comestível.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Alface	Luna Sensation	Esclerotinia	0.6-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da planta (máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Alface	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.8-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da planta (máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Alface	Luna Sensation	Rizoctónia	0.8-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da planta (máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Alface de cordeiro	Luna Sensation	Rizoctónia	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da parte comestível.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Alface de cordeiro	Luna Sensation	Scierotinia	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, durante o desenvolvimento da parte comestível.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Amora-silvestre	Luna Sensation	Antracnose	0.6-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos. Máximo de 2 aplicações em estufa e 1 aplicação em ar livre.
Amora-silvestre	Luna Sensation	Oídio	0.6-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos. Máximo de 2 aplicações em estufa e 1 aplicação em ar livre.
Amora-silvestre	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.6-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infecção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos. Máximo de 2 aplicações em estufa e 1 aplicação em ar livre.
Beringela	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.6 L/ha	Tratar ao aparecimento da doença, a partir das primeiras inflorescências (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa.

Groselheira-vermelha	Luna Sensation	Antracnose	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Groselheira-vermelha	Luna Sensation	Oídio	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Groselheira-vermelha	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Lentilhas	Luna Sensation	Ascoquita	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Lentilhas	Luna Sensation	Oídio	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Lentilhas	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Lentilhas	Luna Sensation	Scierotinia	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Mirtilo	Luna Sensation	Antracnose	0.6-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa.
Mirtilo	Luna Sensation	Oídio	0.6-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa.
Mirtilo	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.6-0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa.
Mirtilo-azul	Luna Sensation	Antracnose	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Mirtilo-azul	Luna Sensation	Oídio	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Mirtilo-azul	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Mirtilo-vermelho	Luna Sensation	Antracnose	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Mirtilo-vermelho	Luna Sensation	Oídio	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Mirtilo-vermelho	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre o início da folhagem e a maturação dos frutos.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Morango	Luna Sensation	Oídio	0.6-0.8 L/ha	Tratar após formação dos estolhos e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa. Não aplicar em plantas acima de 1 m de altura.
Morango	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.6-0.8 L/ha	Tratar após formação dos estolhos e repetir após 7 dias (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa. Não aplicar em plantas acima de 1 m de altura.
Pimento	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.6 L/ha	Tratar após as inflorescências e repetir após 10-14 dias (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa.
Plantas ornamentais	Luna Sensation	Oídio	0.3-0.8 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*). Autorizado no âmbito dos usos menores.
Tomate	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.6 L/ha	Tratar ao aparecimento da doença, a partir das primeiras inflorescências (máximo de 2 aplicações). Aplicar apenas em estufa.
Tremoço	Luna Sensation	Ascoquita	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Tremoço	Luna Sensation	Oídio	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Tremoço	Luna Sensation	Podridão cinzenta	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.
Tremoço	Luna Sensation	Scierotinia	0.8 L/ha	Tratar no aparecimento da infeção, entre os botões florais separados e a colheita.(máximo de 1 aplicação). Aplicar apenas em ar livre.

Precauções Biológicas

Para evitar o desenvolvimento de resistências, respeitar o n.º de aplicações recomendadas por cultura e alternar com fungicidas de outro modo de ação.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



**Nocivo por ingestão.
Muito tóxico para organismos aquáticos.**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

- 1 dia em morango
- 3 dias em amora, beringela, framboesa, pimento e tomate
- 7 dias em alface, groselha e mirtilo

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.