Ficha técnica

MonSoon Active

Herbicida que controla infestantes na cultura do milho

Formulação/Composição

Dispersão em óleo (OD) com 15 g/L de ciprosulfamida, 31,5 g/L de foramsulfurão-sódio e 10 g/L de tiencarbazona-metilo

Propriedades

- O **MonSoon Active** é um herbicida de absorção foliar e residual para aplicação em pós-emergência da cultura, destinado ao controlo das infestantes anuais (incluindo sorgo bravo) na cultura do milho.

- É uma mistura de foramsulfurão-sódio e tiencarbazona-metilo com ciprosulfamida (*safener*).

- O foramsulfurão-sódio pertence à família das sulfonilureias, é sistémico e tem absorção essencialmente por via foliar.

- A tiencarbazona-metilo pertence ao grupo químico sulfonil-amino carbonil-triazolinona (SACT), é residual e tem absorção por via foliar/radicular.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Milho	MonSoon Active	Infestantes (ervas)	0.4-0.65 L/hL	1.5-2 L/ha	Aplicar em **pós-emergência precoce** da cultura ou 3-4 folhas do milho, **após emergência da maioria das infestantes** (máximo de 1 aplicação).

Precauções Biológicas

- Utilizar a dose mais elevada em solos pesados, com infestações de sorgo bravo ou infestantes mais desenvolvidas.

- Na altura da aplicação, o solo deve estar bem preparado, liso, sem pedras/torrões e com suficiente humidade.

- No caso da cultura estar com asfixia radicular, ataques de parasitas, carências nutricionais e stress ou ser inadvertidamente sujeita a sobreposição, podem observar-se alguns sintomas como amarelecimento temporário ou nanismo. Estes sintomas desaparecem após 30 dias e não têm influência no rendimento da cultura.

- Para evitar a indução de resistências, não aplicar o **MonSoon Active** ou qualquer outro herbicida que contenha substâncias ativas das famílias químicas de imidazolinas, pirimidiniloxibenzoatos, sulfonilureias e/ou triazolopirimidinas, durante mais de 3 anos seguidos. De preferência, alternar com herbicidas de outro modo de ação.

- Em caso de destruição acidental do milho com **MonSoon Active**, é possível voltar a semear a cultura após uma mobilização superficial (10 cm) e um mês de intervalo.

- É possível semear posteriormente uma cultura de outono em rotação de culturas, tal como: aveia, cevada, ervilha, trigos e triticale, entre outras.

- Não aplicar o herbicida com temperaturas do ar superiores a 25ºC ou inferiores a 10ºC. Recomenda-se aplicar com temperaturas de 12-22ºC.

- Não aplicar na cultura do milho consociado com feijão ou com outras culturas sensíveis.

- Não aplicar em milho doce, milho para multiplicação ou pipocas.

- Não contaminar adubos, inseticidas, fungicidas e sementes.

- Não misturar o herbicida com adubos líquidos.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS

Provoca irritação das vias respiratórias, lesões oculares graves e reação alérgica.
Muito tóxico para organismos aquáticos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

não aplicável

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.