



Movento O-TEQ

Inseticida sistémico de contacto e ingestão para o combate de Afídeos (beringela, pimento e tomate), Cochonilhas (citrinos e videira) e Mosca Branca (beringela, citrinos, pimento e tomate)

Formulação/Composição

Dispersão em óleo (OD) com 150 g/L de espirotetramato

Propriedades

- O **Movento O-TEQ** é um inseticida à base de espirotetramato, substância ativa da nova família dos ácidos tetrónicos.
- O espirotetramato tem um modo de ação novo: interfere na biossíntese dos lípidos.
- É um produto com sistemática ascendente/descendente, atuando por contacto e ingestão.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Beringela	Movento O-TEQ	Afídeos	40-60 mL/hL	0.4-0.6 L/ha	Iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Beringela	Movento O-TEQ	Mosca branca	40-60 mL/hL	0.4-0.6 L/ha	Iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Citrinos	Movento O-TEQ	Cochonilhas	20-50 mL/hL	0.3-0.5 L/ha	Aplicar no aparecimento das formas móveis. Repetir o tratamento após 21 dias (máximo de 2 aplicações).
Citrinos	Movento O-TEQ	Mosca branca	20-30 mL/hL	0.3 L/ha	Iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Repetir após 21 dias (máximo de 2 aplicações).
Couves	Movento O-TEQ	Mosca branca	10-50 mL/hL	0.1-0.5 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores)
Ervas aromáticas	Movento O-TEQ	Afídeos	50 mL/hL	0.5 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores)
Feno grego	Movento O-TEQ	Afídeos	50 mL/hL	0.5 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (* Autorizado no âmbito dos usos menores)
Pimento	Movento O-TEQ	Afídeos	40-60 mL/hL	0.4-0.6 L/ha	Iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Pimento	Movento O-TEQ	Mosca branca	40-60 mL/hL	0.4-0.6 L/ha	Iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Tomate	Movento O-TEQ	Afídeos	40-60 mL/hL	0.4-0.6 L/ha	Iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).

Tomate	Movento O-TEQ	Mosca branca	40-60 mL/hL	0.4-0.6 L/ha	Iniciar os tratamentos no princípio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações).
Videira (uva de mesa)	Movento O-TEQ	Cochonilhas	50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar no aparecimento das formas móveis. Repetir após 21 dias (máximo de 2 aplicações).
Videira (uva para vinificação)	Movento O-TEQ	Cochonilhas	50 mL/hL	0.5 L/ha	Aplicar no aparecimento das formas móveis. Repetir após 21 dias (máximo de 2 aplicações).

Precauções Biológicas

- Em algumas circunstâncias de baixas temperaturas ou stress hídrico poderão verificar-se sintomas de fitotoxicidade em algumas variedades de citrinos.
- De modo a evitar o aparecimento de resistências a este inseticida, o **Movento O-TEQ** deve ser usado em programas de pulverização com alternância de inseticidas com outros grupos químicos e diferentes modos de ação.
- Não se recomenda a mistura de **Movento O-TEQ** com outros produtos.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



Provoca uma reação alérgica cutânea.
Suspeito de afetar a fertilidade/o nascituro.

Tóxico para organismos aquáticos.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

- 3 dias em beringela, pimento e tomate
- 14 dias em citrinos e videira

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.