



Previcur Energy

Fungicida indicado no controlo do Míldio (alface e espinafre) e da Murchidão das plantas

Formulação/Composição

Solução concentrada (SC) com 310 g/L de fosetil e 530 g/L de propamocarbe

Propriedades

■ O **Previcur Energy** é um fungicida sistémico com fosetil e propamocarbe. O fosetil é um composto pertencente ao grupo dos fosfonatos, que atua as defesas da planta e interfere no metabolismo fosfatado dos fungos. O propamocarbe é um carbamato sistémico que altera a permeabilidade das membranas celulares e inibe a síntese dos ácidos gordos.

■ O produto tem atividade preventiva e curativa.

■ Controla o míldio e a murchidão das plantas (*Phytophthora* spp. e *Pythium* spp.) de várias culturas hortícolas.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

| Cultura | Produto | Problema | Conc. | Dose | Modo de Emprego |
|-----------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|---|
| Abóbora | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |
| Alface | Previcur Energy | Míldio | 0.25 L/hL | 2.5 L/ha | Realizar 1 aplicação preventiva. Se necessário, repetir após 10-15 dias (máximo de duas aplicações). |
| Alface | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 30 mL/L | 3 mL/m ² | Tratar após sementeira e repetir após 10 dias (máximo de duas aplicações). Aplicar apenas em viveiro. |
| Beringela | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |
| Courgette | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |
| Couves | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 30 mL/L | 3 mL/m ² | Tratar após sementeira e repetir após 10 dias (máximo de duas aplicações). Aplicar apenas em viveiro. |
| Espinafre | Previcur Energy | Míldio | 0.25 L/hL | 2.5 L/ha | Aplicar preventivamente (máximo de 1 aplicação). |
| Melancia | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |
| Melão | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |
| Pepino | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |
| Pimento | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------|---|
| Plantas ornamentais | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 30 mL/L | 3 mL/m ² | Tratar após sementeira e repetir após 10 dias (máximo de duas aplicações). Aplicar apenas em viveiro. |
| Rúcula | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 30 mL/L | 3 mL/m ² | Tratar após sementeira e repetir após 10 dias (máximo de duas aplicações). Aplicar apenas em viveiro. |
| Rúcula selvagem | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 30 mL/L | 3 mL/m ² | Tratar após sementeira e repetir após 10 dias (máximo de duas aplicações). Aplicar apenas em viveiro. |
| Tomate | Previcur Energy | Murchidão das plantas | 0.2-0.3 L/hL | 2-3 L/ha | Na plantação , tratar após o transplante (por rega gota a gota). No viveiro , tratar após sementeira (3 mL/m ²) e repetir posteriormente (máximo de duas aplicações). |

Precauções Biológicas

- No caso das pulverizações foliares, humedecer previamente o solo/aplicar em solo húmido.
- Considerando a elevada sensibilidade de algumas culturas ornamentais, recomenda-se a realização de um pequeno ensaio preliminar de fitotoxicidade em uma ou duas plantas, antes da utilização generalizada do **Previcur Energy**.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



Provoca uma reação alérgica cutânea.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

- 14 dias em alface e espinafre (ar livre)
- 21 dias em alface (estufa)

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.