



## Prosaro

Fungicida indicado para proteção da Cevada (ferrugens, helmintosporiose, oídio e rincosporiose) e dos Trigos (ferrugens, fusarioses, oídio e septoriose)

### Formulação/Composição

Concentrado (EC) com 12% de protioconazol e 12% de tebuconazol

### Propriedades

- **Prosaro** é um fungicida do grupo dos triazóis que atua na desmetilação da síntese de esteróis (DMI).
- É um fungicida sistémico com atividade preventiva/curativa no combate a várias doenças que atacam as espigas e as folhas da cevada e dos trigos.

### Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Cevada	Prosaro	Ferrugens	0.2-0.33 L/hL	0.8-1 L/ha	Aplicar quando surgirem os 1.ºs sintomas, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs. (máximo de 1 aplicação)
Cevada	Prosaro	Helmintosporiose	0.2-0.33 L/hL	0.8-1 L/ha	Aplicar quando surgirem os 1.ºs sintomas, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs. (máximo de 1 aplicação)
Cevada	Prosaro	Oídio	0.2-0.33 L/hL	0.8-1 L/ha	Aplicar quando surgirem os 1.ºs sintomas, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs. (máximo de 1 aplicação)
Cevada	Prosaro	Rincosporiose	0.2-0.33 L/hL	0.8-1 L/ha	Aplicar quando surgirem os 1.ºs sintomas, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs. (máximo de 1 aplicação)
Feijão frade	Prosaro	Antracnose	0.25-0.33 L/hL	1 L/ha	Consultar o site da DGAV ( <a href="https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos">https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos</a> ) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Grão	Prosaro	Raiva	0.25-0.33 L/hL	1 L/ha	Consultar o site da DGAV ( <a href="https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos">https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos</a> ) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Trigos	Prosaro	Ferrugens	0.2-0.33 L/hL	0.8-1 L/ha	Aplicar quando surgirem os 1.ºs sintomas, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs. (máximo de 1 aplicação)
Trigos	Prosaro	Fusarioses	0.25-0.33 L/hL	1 L/ha	Tratar preventivamente no início da floração (ântese), sob condições favoráveis à doença, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs (máximo de 1 aplicação).
Trigos	Prosaro	Oídio	0.2-0.33 L/hL	0.8-1 L/ha	Aplicar quando surgirem os 1.ºs sintomas, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs. (máximo de 1 aplicação)

Trigos	Prosaro	Septoriose	0.2-0.33 L/hL	0.8-1 L/ha	Aplicar quando surgirem os 1.ºs sintomas, de forma a manter as duas folhas "bandeira" sãs. (máximo de 1 aplicação)
--------	---------	------------	---------------	------------	---

### Precauções Biológicas

- Em anos muito favoráveis à doença, realizar um 2.º tratamento (após 2-3 semanas) entre o início do encanamento e o espigamento, com um produto de outro modo de ação.
- No caso de variedades sensíveis, efetuar também um 2.º tratamento na presença de sintomas e condições favoráveis à doença, usando um produto com diferente modo de ação.
- Em algumas condições, este produto induz necroses difusas nas folhas dos cereais tratados, sem efeitos negativos na produtividade.
- Alternar o uso do produto com fungicidas de outro modo de ação.

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS



**Provoca irritação cutânea.  
Suspeito de afetar o nascituro.  
Tóxico para organismos aquáticos.**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

### Intervalo de Segurança

35 dias

**NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.**