



## Sencor Liquid

Herbicida residual contra infestantes de batata, cenoura e tomate

### Formulação/Composição

Suspensão concentrada (SC) com 600 g/L de metribuzina

### Propriedades

- O **Sencor Liquid** é um herbicida residual e sistémico, com alguma ação de contacto.
- Evidencia absorção foliar e radicular, destinando-se ao controlo de infestantes anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas nas culturas de batata, cenoura e tomate.
- A metribuzina é uma 1,2,4-triazinona (pertence à família química das triazinas) e tem como mecanismo de ação a inibição da fotossíntese ao nível do fotossistema II.

### Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Conc.	Dose	Modo de Emprego
Batata	Sencor Liquid	Infestantes (ervas)	150-250 mL/hL	0.875 L/ha	Aplicar em pré-emergência da cultura ou até 5% dos brotos atingirem as 2 folhas verdadeiras (2-5 cm). As infestantes não devem ultrapassar as 2 folhas.
Cana de açúcar	Sencor Liquid	Infestantes (ervas)	150-250 mL/hL	0.875 L/ha	Consultar o site da DGAV ( <a href="http://www.dgmin-agricultura.pt">www.dgmin-agricultura.pt</a> ) (* Autorizado no âmbito dos usos menores.
Cenoura	Sencor Liquid	Infestantes (ervas)	50-60 mL/hL	0.25 L/ha	Aplicar o herbicida a partir das 2-3 folhas da cultura, entre a emergência das infestantes e a fase das 2 folhas.
Tomate	Sencor Liquid	Infestantes (ervas)	150-250 mL/hL	0.875 L/ha	Aplicar o herbicida após a crise de transplantação, entre a emergência das infestantes e a fase de 2 folhas.

### Precauções Biológicas

**Batata:** No momento da aplicação, o solo deve estar húmido e bem preparado. Não mobilizar o solo depois da aplicação. Sempre que possível, a amontoa deve ser feita antes da aplicação do herbicida (mais cedo que o habitual). Não aplicar em batatais semeados em zonas de areia solta.

**Cenoura:** No momento da aplicação, o solo deve estar húmido e bem preparado. Não aplicar com o terreno seco. Se necessário, proceder a uma rega depois da aplicação. Não mobilizar o solo após a aplicação.

**Tomate:** O herbicida deve ser pulverizado nos regos. A terra deve estar molhada ou muito húmida para que o herbicida atue e seja incorporado no solo. Se a terra estiver enxuta, deverá proceder-se a uma rega na hora seguinte à aplicação. Evitar aplicar o herbicida em tomatais com plantas doentes.

- Tendo em vista minorar riscos de resistência, recomenda-se não aplicar o **Sencor Liquid** mais do que 2 anos consecutivos nos mesmos solos, procedendo à alternância com herbicidas de modo de ação diferente.
- A aplicação repetida do **Sencor Liquid** ou herbicidas com igual modo de ação pode induzir o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes rotuladas como suscetíveis.
- Não se deve semear ou plantar qualquer cultura não referida no rótulo antes de passarem 5 meses da aplicação do **Sencor Liquid**.

- Não aplicar o herbicida em mistura com adubos líquidos.

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS

---



**Muito tóxico para organismos aquáticos.**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

### Intervalo de Segurança

---

não aplicável

**NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.**