Ficha técnica

Volare

Fungicida preventivo indicado para o controlo do Míldio em alface, batateira e cucurbitáceas

Formulação/Composição

Suspensão concentrada (SC) com 62,5 g/L ou 5,5% (p/p) de fluopicolida e 524 g/L ou 46,4% (p/p) de propamocarbe (sob a forma de hidrocloreto)

Propriedades

- O **Volare** é um fungicida à base de fluopicolida (família das benzamidas) e hidrocloreto de propamocarbe (carbamato).
- A fluopicolida apresenta mobilidade translaminar, havendo uma redistribuição no órgão tratado (via xilema), enquanto o hidrocloreto de propamocarbe apresenta mobilidade ascendente.
- O **Volare** tem atividade preventiva.

Utilizações, Doses/Concentrações, Épocas e Condições de Aplicação

Cultura	Produto	Problema	Dose	Modo de Emprego
Alface	Volare	Míldio	1.4-1.6 L/ha	A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença.
Batata	Volare	Míldio	1.2-1.4 L/ha	A persistência biológica do produto é de 7-10 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença.
Courgette	Volare	Míldio	1.4-1.6 L/ha	A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença.
Couves	Volare	Míldio	1.6 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Ervas aromáticas	Volare	Míldio	0.6-1.4 L/ha	Consultar o site da DGAV (https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos) (*) Autorizado no âmbito dos usos menores.
Melancia	Volare	Míldio	1.4-1.6 L/ha	A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença.
Melão	Volare	Míldio	1.4-1.6 L/ha	A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença.
Pepino	Volare	Míldio	1.4-1.6 L/ha	A persistência biológica do produto é de 7-12 dias. Utilizar a dose mais elevada/intervalo mais curto sob maior pressão da doença.
Rúcula selvagem	Volare	Míldio	1.4-1.6 L/ha	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas, em condições climáticas favoráveis à doença. (Ar livre BBCH 11-18; Protegida BBCH 11-19). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo de 7 dias, entre aplicações. Volume de calda: 400 a 1000 L/ha. Intervalo de segurança: 14 dias ar livre 21 protegidas.

Precauções Biológicas

- Para evitar o desenvolvimento de resistências **não aplicar o Volare mais de 3 vezes por cultura e campanha, exceto na alface (máximo de 2 aplicações)**, devendo utilizar-se fungicidas com diferentes modos de ação.

- Desaconselha-se a utilização do **Volare** em aplicações curativas.

- Não aplicar **Volare** nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLOGICAS E AMBIENTAIS

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Suspeito de afectar o nascituro.

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef.: 800 250 250.

Intervalo de Segurança

- 1 dia em courgette (estufa) e pepino (estufa)
- 3 dias em courgette (ar livre), melancia, melão e pepino (ar livre)
- 7 dias em alface (ar livre) e batata
- 21 dias em alface (estufa)

NOTA: As informações contidas nesta Ficha Técnica não dispensam a leitura atenta do rótulo da embalagem.